

Barolex

Hydralazine HCl

TA PHARMA
Total Quality
شركة التقدم للصناعات الدوائية
Al-Taqaddom Pharmaceutical Industries

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

1. What Barolex is and what it is used for.
2. Before you take Barolex.
3. How to take Barolex.
4. Possible side effects.
5. How to store Barolex.
6. Further information.

1. What Barolex is and what it is used for:

Pharmacotherapeutic group: Barolex belongs to a group of medicines called vasodilators. These medicines relax the muscles of artery walls and cause blood vessels to expand.

Therapeutic indications:

Barolex tablets are used to:

- Treat moderate to severe high blood pressure (with or without a beta-blocker or diuretic medicine).
- Manage moderate to severe congestive heart failure (where use of other medicines alone are not enough).

2. Before you take Barolex:

a. Do not take Barolex if you have:

- An allergy to hydralazine, dihydralazine or any of the other ingredients in this medicine.
- A racing heart beat (tachycardia).
- Heart failure caused by narrowing of blood vessels or heart valves (aortic or mitral stenosis), high blood pressure in blood vessels supplying the lungs (pulmonary hypertension) or inflammation of the heart (constrictive pericarditis).
- Heart failure with a normal or increased output of blood from the heart (e.g. in thyrotoxicosis).
- Systemic lupus erythematosus (SLE) or any related disease.
- A relative has a blood vessel wall (aortic aneurism).
- A relative has an inherited disorder of the red blood pigment haemoglobin (porphyria).

b. Take special care with Barolex:

Talk to your doctor or pharmacist before taking Barolex tablets if you:

- Have had a heart attack in the past three months.
- Have coronary heart disease.
- Have angina pectoris, which causes pain in the chest with exercise.
- Have cerebrovascular disease (narrowing of the blood vessels in the brain).
- Have been told you are a slow acetylator (this means that your body handles some medicines more slowly than other people).
- Suffer from any serious liver or kidney problems.

Tests

If you are taking long-term Barolex treatment, your doctor may want to carry out blood and urine tests every 6 months.

6. Taking other medicines, herbal, or dietary supplements:

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a

prescription.

Other medicines and Barolex:

It is especially important to tell your doctor if you are taking:

- Medicines for high blood pressure, such as vasodilators (e.g. minoxidil, diazoxide).
- ACE inhibitors (e.g. enalapril, lisinopril, captopril).
- Beta-blockers (e.g. propranolol).
- Calcium antagonists (e.g. nifedipine or diltiazem).
- Medicines for water retention (e.g. diuretics).
- Medicines for problems such as depression, including monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) (e.g. moclobemide, phenelzine, isocarboxazid, tranylcypromine).
- Tricyclic antidepressants (e.g. amitriptyline, clomipramine) or tranquillisers (e.g. diazepam).
- Medicines to control pain and inflammation (a group of medicines known as non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)).
- Medicines to control psychosis.
- A specific group of medicines known as nitrates, used to control blood pressure.
- Oestrogens (a group of female sex hormones used in contraception and in treating the menopause).
- Muscle relaxants (e.g. baclofen, tizanidine).
- Medicines that stimulate the nervous system (e.g. adrenaline, norepinephrine).
- Steroids.

If you are going to have general anaesthetic, you should tell the doctor or dentist in charge that you are taking Barolex tablets.

d. Barolex tablets with alcohol:

It is advisable not to drink alcohol whilst taking Barolex tablets as it may affect you more than usual.

e. Pregnancy and breast-feeding:

If you are pregnant, trying to become pregnant or breast-feeding, please tell your doctor before taking Barolex Tablets.

f. Driving and using machines:

You can drive while taking Barolex but do not drive until you know how the tablets affect you. They may make you feel dizzy. If they affect you in this way, do not drive or operate any machinery.

3. How to take Barolex:

Always take Barolex exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

- Speak to your doctor before drinking alcohol with this medicine.
- Swallow these tablets with water.

Dosage:

The recommended dose is:

Adults (including the elderly):

- Hypertension: Initially 25mg twice a day or 50mg once a day. Your doctor may gradually increase this, up to a maximum of 200mg a day. Your doctor will decide the best dose for you.
- Chronic congestive heart failure: Treatment should be started in hospital and dosages can vary. The maintenance dose is 50mg - 75mg four times a day.

Use in children:

Not recommended.

If you take more Barolex than you should:

If you (or someone else) swallow a lot of the tablets at the same time or if you think a child may have swallowed any, contact your nearest hospital casualty department or tell your doctor immediately.

Symptoms of an overdose include: low blood pressure, racing heart beat, decreased blood flow to the heart, irregular heart beat, coma.

If you forget to take Barolex:

Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you forget to take a dose take it as soon as you remember it and then take the next dose at the right time.

If you stop taking Barolex tablets:

Do not stop treatment early because an increase in blood pressure may occur. Talk to your doctor before you stop taking the tablets and follow their advice.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor, or pharmacist.

4. Possible side effects:

Like all medicines, Barolex can cause side effects, although not everybody gets them.

Stop taking the medicine and seek immediate medical advice if you notice the following:

- SLE-type syndrome, which can cause symptoms such as joint pain, fever, change in blood count and skin rash.
- Allergic reactions including itching, skin rash, inflammation of the walls of small blood vessels and difficulty in breathing.
- Yellowing of the skin and whites of the eyes, which may indicate problems with the liver such as jaundice and hepatitis.

Other side effects may include:

Very common (may affect more than 1 in 10 people):

- Abnormal heart beat (palpitations).
- An unusually fast heart beat.
- Headaches.

Common (may affect up to 1 in 10 people):

- Chest pains.
- Swelling and/or pain in joints, muscle pain.
- Low blood pressure.
- Feeling sick and being sick, particularly at the beginning of the treatment or after an increase in dose.
- Diarrhoea.
- Flushing.

Uncommon (may affect up to 1 in 100 people):

- Heart failure, swelling.
- Increased levels of substances called creatinine in the blood.
- Breathlessness, breathing difficulties or pain when breathing.
- Skin rash.
- Blood in the urine which may be associated with a disease of the kidneys.
- Presence of protein in the urine.
- Inflammation or the abnormal functioning of the liver.
- Watery or sore itchy eyes.
- A reduction in the number of platelets in the blood which can cause unexplained bruising or rashes.
- A reduction in certain white blood cells which may make you more susceptible to infections.
- An increase in other kinds of white blood cells.
- Fever.
- Anxiety.
- Restlessness.
- Blocked or stuffy nose.
- Loss of appetite.
- Weight loss.
- Dizziness.
- Generally feeling unwell.

Rare (may affect up to 1 in 1,000 people):

- Kidney failure.
- A change in the amount of urine produced.
- A restriction of movement in part of the intestine.
- Episodes of high blood pressure.
- A deficiency of certain white blood cells which can result in fever and ulceration of the mouth and throat.
- An increased number of white blood cells.
- Enlargement of the spleen.
- A reduction in the number of red and white blood cells and platelets in the blood.
- Depression.
- Seeing or hearing things which are not really there (hallucinations).

- Inflammation of the nerves which may cause weakness or numbness especially in your fingers and toes.

- Tingling (pins and needles) in your hands or feet.

- Disease of the lymph nodes.

- Enlarged eye balls.

If you feel very tired, experience unexpected bruising or bleeding, or more infections (e.g. colds and sore throats) than usual, please tell your doctor. Your doctor may decide to conduct tests on your blood periodically as a result of these symptoms.

Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly via the Yellow Card Scheme at: www.mhra.gov.uk/yellowcard

By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

5. How to store Barolex

- Keep out of the reach and sight of children.
- Do not use Barolex after the expiry date, which is stated on the carton and the blister after Exp. The expiry date refers to the last day of that month.
- Do not store above 30°C.
- Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

6. Further information

a. What Barolex contains:

The active substance is: hydralazine hydrochloride.

b. What Barolex look like and contents of the pack:

Barolex 25: Each tablet contains 25 mg hydralazine hydrochloride in packs of 30 tablet.

Barolex 50: Each tablet contains 50mg hydralazine hydrochloride in packs of 30 tablet.

The other ingredient: Microcrystalline cellulose, dicalcium phosphate anhydrous, polyvinyl pyrrolidone (K30), sodium starch glycolate, stearic acid, colloidal anhydrous silica, Quinoline yellow AL lake.

- Physical Description:

Barolex 25: Yellow to light yellow, round, flat tablet with 'C' and '1' debossed on either side of breakline on one side and plain on the other side.

Barolex 50: Yellow to light yellow, round, flat tablet with 'C' and '2' debossed on either side of breakline on one side and plain on the other side.

- Pharmaceutical form:

Tablet for oral use.

Barolex are packed in: Alu, Peelable Alu Blister in carton box with a folded leaflet.

c. Marketing Authorization Holder

Al-Taqaddom Pharmaceutical Industries

Almwaqqar – Amman, Jordan

Tel.: +962-6-4050092

Fax: +962-6-4050091

P.O. Box: 1019 Amman 11947 Jordan

Email: info@tqpharma.com

d. This leaflet was last approved

in 07/ 2018; I-Barolex-LMO-R0/AE

This is a medicament

- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
 - Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
 - The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
 - Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
 - Do not repeat the same prescription without consulting your doctor
 - Keep medicament out of the reach of children.
- COUNCIL OF ARAB HEALTH MINISTERS
UNION OF ARAB PHARMACISTS

2254

2254

باروليڪس

هيدرالازين هيدروكلوريد



قم بقراءة هذه النشرة جيدا قبل استعمال أو تناول هذا الدواء

- احتفظ بهذه النشرة، لأنك قد تحتاج إليها لاحقاً.

- في حال كانت لديك أية أسئلة تتعلق بهذا المستحضر قم باستشارة الطبيب أو الصيدلي.

- إن هذا الدواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناءً على وصفة طبية، ولهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص، قد يضر به، حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها.

- قم بالاتصال بطبيبك المانع أو الصيدلي في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الإصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

تحتوي هذه النشرة على:

1. ما هو باروليڪس و ما هي دواعي استعماله.
2. قبل القيام بتناول أو استعمال باروليڪس.
3. طريقة استعمال باروليڪس.
4. الأعراض الجانبية المحتملة.
5. ظروف تخزين باروليڪس.
6. معلومات إضافية.

1. ما هو باروليڪس و ما هي دواعي استعماله:

المجموعة العلاجية:

ينتمي باروليڪس إلى مجموعة من الأدوية تسمى مسومات الأوعية، هذه الأدوية تساعد على ارتخاء عضلات جدران الشرايين وتسبب في توسيع الأوعية الدموية.

الاستخدامات:

يستعمل باروليڪس في:

- علاج ارتفاع ضغط الدم المتوسط إلى الشديد (مع أو بدون استخدام حاصرات مستقبلات بيتا أو الأدوية المدرة للبول).
- علاج فشل القلب الاحتقاني المتوسط إلى الشديد (في حال استخدام الأدوية الأخرى لا يعتبر كافياً).

2. قبل القيام بتناول أو استعمال باروليڪس:

أ. لا تأخذ باروليڪس إذا كنت تعاني من:

- حساسية (فرط التحسس) مادة هيدرالازين، داي هيدرالازين أو لأي من المكونات الأخرى الموجودة في هذا الدواء.
- شراع نبضات القلب (تسارع ضربات القلب).

- فشل القلب الناتج عن تضيق الأوعية الدموية أو صمام القلب (تضيق الشريان الأبهر). ارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية التي تزود الرئتان (ارتفاع ضغط الدم الرئوي) أو حدوث التهاب في غشاء القلب. فشل القلب سواء كان تدفق الدم من القلب طبيعي أو حدث زيادة فيه (الانسداد الدريقي).

- الذئبة الحمامية الجهازية (SLE) أو أي مرض ذو صلة.

- نوم في جدار الوعاء الدموي (تعدد الأبهر).

- (إذا كان أحد الأقارب) يعاني من اضطراب وراثي في أصباغ هيموغلوبين خلايا الدم الحمراء (البورفيريا).

ب. الاحتياطات عند استعمال باروليڪس:

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أقراص باروليڪس إذا:

- تعرضت لنوبة قلبية في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

- تعاني من مرض القلب التاجي.

- تعاني من دجحة صدرية و التي قد تسبب لديك ألم في الصدر عند ممارسة التمارين.

- تعاني من الأمراض القلبية الوعائية (تضيق الأوعية الدموية في الدماغ).

- تم إخبارك بأن لديك طعم في عملية الأستلة (وهذا يعني أن جسمك يعامل بعض الأدوية بطيء أكثر من الآخرين).

- تعاني من أي مشاكل خطيرة في الكبد أو في الكلى.

فحوصات

إذا كنت تتناول علاج باروليڪس لمدة طويلة قد يطلب منك طبيبك إجراء فحوصات للدم والبول كل 6 أشهر.

ج. التداخلات الدوائية عند أخذ هذا المستحضر مع أي أدوية أخرى أو أعشاب أو مكملات غذائية، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو قد تناولت مؤخراً أية أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية.

الأدوية الأخرى و باروليڪس:

من المهم بشكل خاص أن تخبر طبيبك إذا كنت تتناول:

- أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، مثل مسومات الأوعية (مثل مينوكسيديل، ديازوكسيد).
- مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (مثل إنالابريل، ليسينابريل، كابتوبريل).
- حاصرات مستقبلات بيتا (مثل بروبرانولول).

- مضادات الكالسيوم (مثل نيفيديين أو ديلتيازيم).

- أدوية لإحتباس الماء (مثل مدرات البول).

- أدوية الاكتئاب، بما في ذلك مثبطات أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs) (مثل موكالويد، فينيلزين، إيزوكاربوكسيد، ترانيلسپرومين).

- مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (مثل اميتريبتاين أو كلوميبرامين) أو مواد مهدئة (مثل الديازيبام).

- أدوية للسيطرة على الألم والالتهابات (مجموعة من الأدوية تعرف باسم الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهاب (NSAIDs).

- أدوية للسيطرة على الدهون.

- مجموعة معينة من الأدوية تعرف باسم الثورات، وتستخدم للسيطرة على ضغط الدم.

- الاستروجين (مجموعة من الهرمونات الجنسية الأنثوية المستخدمة في منع الحمل وفي علاج انقطاع الطمث).

- مرخيات العضلات (على سبيل المثال باكليفين وتيريندين).

- الأدوية التي تحفز الجهاز العصبي (مثل الأدرينالين والتوراينيدين).

- الستيرويدات.

إذا كنت ستخضع لتخدير عام، يجب أن تخبر الطبيب أو طبيب الأسنان المسؤول أنك تتناول أقراص باروليڪس.

د. تناول أقراص باروليڪس مع الكحول:

من المستحسن عدم شرب الكحول أثناء تناول أقراص باروليڪس لأنها قد تؤثر عليك أكثر من المعتاد.

ه. الحمل والرضاعة:

إذا كنت حاملاً أو تخططين لتصبحي حاملاً أو تقومين بالرضاعة الطبيعية، يرجى إخبار الطبيب قبل تناول أقراص باروليڪس.

و. القيادة واستعمال الآلات:

يمكنك القيادة أثناء استخدام باروليڪس ولكن لا تتم بالقيادة حتى تتأكد من تأثير هذه الأقراص عليك. قد تجعلك هذه الأقراص تشعر بالدوار. إذا أثرت عليك بهذه الطريقة، لا تقد أو قم بتشغيل أية آلة.

3. طريقة استعمال باروليڪس:

تناول باروليڪس دائماً بالطريقة التي أخبرك بها طبيبك. تحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكد.

- تحدث إلى طبيبك قبل شرب الكحول مع هذا الدواء.

- ابتلع هذه الأقراص مع الماء.

الجرعة:

الجرعة الموصى بها هي:

التيكاز (بما في ذلك كيارالسين):

- ارتفاع ضغط الدم: في البداية ٢٥ ملغم مرتين في اليوم أو ٥٠ ملغم مرة واحدة في اليوم. قد يزيد طبيبك هذه الجرعة تدريجياً، بعد أقصى ٢٠٠ ملغم يومياً. سيقدر طبيبك أفضل جرعة مناسبة لك.

- قصور القلب الاحتقاني المزمن: يجب بدء العلاج في المستشفى وقد تختلف الجرعات. تبلغ الجرعة الاستمرارية ٥٠ ملغم - ٧٥ ملغم أربع مرات في اليوم.

الاستخدام في الأطفال:

لا ينصح به.

إذا تناولت باروليڪس أكثر مما يجب:

إذا قمت (أو قام أي شخص آخر) بتناول العديد من الأقراص في نفس الوقت، أو إذا كنت تتقدم بأن طفل ربما قام بتناولها، قم

بالاتصال بأقرب مستشفى أو أخبر طبيبك على الفور.

تشمل أعراض الجرعة الزائدة على: انخفاض ضغط الدم، تسارع ضربات القلب، انخفاض تدفق الدم إلى القلب، عدم انتظام ضربات القلب، والغيبوبة.

إذا نسيت تناول باروليڪس:

لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض عن الجرعة المنسية.

إذا نسيت تناول جرعة ما، خذها حالاً تتذكرها ثم خذ الجرعة التالية في وقتها الصحيح.

إذا توقفت عن تناول أقراص باروليڪس:

لا تتوقف عن العلاج مبكراً لأن زيادة في ضغط الدم قد تحدث. تحدث إلى طبيبك قبل التوقف عن تناول هذه الأقراص واتبع نصيحته.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء، أسأل طبيبك أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية المحتملة:

كباقي الأدوية الأخرى، قد يسبب باروليڪس أعراض جانبية، على الرغم أنها قد لا تصيب الجميع.

توقف عن تناول الدواء وأطلب المشورة الطبية الفورية إذا لاحظت ما يلي:

- متلازمة SLE، والتي يمكن أن تسبب أعراض مثل ألم المفاصل، الحمى، تغير في عدد كريات الدم والطفح الجلدي.

- الحساسية بما في ذلك الحكة، الطفح الجلدي، التهاب جدران الأوعية الدموية الصغيرة وصعوبة التنفس.

- اصفرار الجلد وبياض العينين، مما قد يشير إلى مشاكل في الكبد مثل اليرقان و التهاب الكبد.

الآثار الجانبية الأخرى:

شائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من ١ من كل ١٠ أشخاص):

- ضربات القلب غير طبيعية (خفقان).

- تسارع ضربات القلب بشكل غير اعتيادي.

- الصداع.

شائعة (قد تؤثر على شخص واحد من كل ١٠ أشخاص):

- آلام في الصدر.

- تورم و/أو ألم في المفاصل، آلام في العضلات.

- ضغط دم منخفض.

- الشعور بالمرض وأن تصبح مريضاً، ولا سيما في بداية العلاج أو بعد زيادة الجرعة.

- إسهال.

- تورد الوجه.

غير شائعة (قد تؤثر على شخص واحد من كل ١٠٠ شخص):

- فشل القلب والتورم.

- زيادة مستويات الكرياتينين في الدم.

- ضيق في التنفس وصعوبة التنفس أو ألم عند التنفس.

- الطفح الجلدي.

- وجع دم في البول الذي قد يترافق مع أمراض في الكلى.

- وجود البروتين في البول.

- التهاب أو اختلال في وظائف الكبد.

- تدمع أو حكة في العينين.

- انخفاض في عدد الصفائح الدموية التي يمكن أن تسبب رضوض أو طلع جلدي غير معروف.

- انخفاض في بعض كريات الدم البيضاء التي قد تجعلك أكثر عرضة للعدوى.

- زيادة في أنواع أخرى من خلايا الدم البيضاء.

- حمى.

- قلق.

- فقدان الراحة.

- انسداد أو انخفاف الأنف.

- فقدان الشهية.

- فقدان الوزن.

- الدوخة.

- الشعور عمومًا بتعب.

نادرة (قد تؤثر على ١ من كل ١٠٠٠ شخص):

- فشل كلوي.

- تغير في كمية البول المنتجة.

- تقييم الحركة في جزء من الأمعاء.

- نوبات ارتفاع ضغط الدم.

- نقص بعض خلايا الدم البيضاء التي يمكن أن تؤدي إلى الحمى وتقرح الفم والحلق.

- عدد متزايد من خلايا الدم البيضاء.

- تضخم الطحال.

- انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية في الدم.

- إكتئاب.

- رؤية أو سماع أشياء ليست موجودة بالفعل (هلوسة).

- التهاب الأعصاب التي قد تسبب ضعف أو خدر خاصة في أصابع اليدين والقدمين.

- وخز (دبابيس وأبر) في يديك أو قدميك.

- مرض الغدة الدرقية.

- تضخم كرات العين.

إذا كنت تشعر بالتهب الشديد، لاحظت حدوث كدمات أو نزيف غير متوقع، أو المزيد من العدوى (مثل نزلات البرد والتهاب الحلق) أكثر من المعتاد، يرجى إبلاغ طبيبك. قد يقرر طبيبك إجراء فحوصات للدم بشكل دوري نتيجة لهذه الأعراض.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا تعرضت لأي من هذه الآثار الجانبية، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة عبر نظام البطاقة الصفراء على: www.mhra.gov.uk/yellowcard

من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في تقديم مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

إذا أصعب أي من الآثار الجانبية خطيراً، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

5. ظروف تخزين باروليڪس

- احفظ الدواء بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.

- لا تشتمل باروليڪس بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المدون على عبوة الكرتون بعد كلمة Exp. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.

- لا تحفظ الدواء في درجة حرارة أعلى من ٣٠°م.

- يجب عدم التخلص من الأدوية خلال مياه الصرف الصحي أو التفتايات المنزلية. أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد لازمة. ومن شأن هذه التدابير أن تساعد على حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

أ. على ماذا يحتوي باروليڪس:

المادة الفعالة: هيدرالازين هيدروكلوريد.

ب. ما هو شكل و محتوى عبوة باروليڪس:

باروليڪس ٢٥: يحتوي كل قرص على ٢٥ ملغم هيدرالازين هيدروكلوريد في كبسولة تحتوي على ٣٠ قرص.

باروليڪس ٥٠: يحتوي كل قرص على ٥٠ ملغم هيدرالازين هيدروكلوريد في كبسولة تحتوي على ٣٠ قرص.

المكونات الأخرى:

مايكروكريستالين سيليلوز، فوسفات ثنائي الكالسيوم عديم التمي، بولي فينيل بيروليدين (ك.٣٠)، صوديوم غليكولات التشتا، حمض الستريك، سيليكات غروية عديمة التمي، صبغة الكوينولين الصفراء.

- الوصف الخارجي:

باروليڪس ٢٥: قرص بلون أصفر فاتح، مستدير، مسطح مع "C" و "١" على جانبي خط الكسر على جانب واحد وفارغ على الجانب الآخر.

باروليڪس ٥٠: قرص بلون أصفر فاتح، مستدير، مسطح مع "C" و "١" على جانبي خط الكسر على جانب واحد وفارغ على الجانب الآخر.

- الشكل الصيدلاني:

أقراص للاستعمال عن طريق الفم.

يتوفر باروليڪس على شكل أشربة قابلة للفتح من الأنثيوم معبأة في عبوة كرتونية مع نشرة مطوية.

ج. اسم وعنوان مالك رخصة التسويق شركة التقدم للصناعات الدوائية

المقر: عمان، الأردن

هاتف: ٩٦٢ ٠٩٢ ٤٠٥٠ - ٦٠٩٦٢ +

فاكس: ٩٦٢ ٠٩١ ٤٠٥٠ - ٦٠٩٦٢ +

صندوق بريد: ١٠١٩ عمان ١١٩٤٧ الأردن

البريد الإلكتروني: info@tqpharma.com

د. تم الموافقة على هذه النشرة بتاريخ

٢٠١٨/٠٧ - Barolex-LMO-RO/AE

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر غير قابل على مسك، وإسقاطه خلالا للتعليمات بعرضه للخطر.

- إبع يدق وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها (وتعليمات الصيدلي التي تصدرها لك).

- إن الطبيب الصيدلي هذا الحبران بالادواء وصفته وضرور.

- لا تقم بفتح الادوية بعد ذلك من قفا، تسد.

- لا تترك صرف الادوية بدون وصفة طبية.

- لا تترك الادوية في متناول ايدي الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيدلة العرب