



Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine:

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

1. What **MOMINT®** is and what it is used for.
2. Before you take **MOMINT®**
3. How to take **MOMINT®**
4. Possible side effects.
5. How to store **MOMINT®**
6. Further information.

1. What **MOMINT®** is and what it is used for:

MOMINT® contains the active substance sildenafil which belongs to a group of medicines called phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors. It works by helping to relax the blood vessels in your penis, allowing blood to flow into your penis when you get sexually excited. **MOMINT®** will only help you to get an erection if you are sexually stimulated.

MOMINT® is a treatment for adult men with erectile dysfunction, sometimes known as impotence. This is when a man cannot get, or keep a hard, erect penis suitable for sexual activity.

2. Before you take **MOMINT®**

a. Do not Take **MOMINT®**

- If you are allergic to sildenafil or any of the other ingredients of this medicine.
- If you are taking medicines called nitrates, as the combination may lead to a dangerous fall in your blood pressure. Tell your doctor if you are taking any of these medicines which are often given for relief of angina pectoris (or "chest pain"). If you are not certain, ask your doctor or pharmacist.
- If you are using any of the medicines known as nitric oxide donors such as amyl nitrite ("poppers"), as the combination may also lead to a dangerous fall in your blood pressure.
- If you are taking riociguat. This drug is used to treat pulmonary arterial hypertension (i.e., high blood pressure in the lungs) and chronic thromboembolic pulmonary hypertension (i.e., high blood pressure in the lungs secondary to blood clots). PDE5 inhibitors, such as **MOMINT®** have been shown to increase the hypotensive effects of this medicine. If you are taking riociguat or are unsure tell your doctor.
- If you have a severe heart or liver problem.
- If you have recently had a stroke or a heart attack, or if you have low blood pressure.
- If you have certain rare inherited eye diseases (such as retinitis pigmentosa).
- If you have ever had loss of vision due to non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION).

b. Take special care with **MOMINT®**

- Talk to your doctor, pharmacist or nurse before taking **MOMINT®**
- If you have sickle cell anaemia (an abnormality of red blood cells), leukaemia (cancer of blood cells), multiple myeloma (cancer of bone marrow).
- If you have a deformity of your penis or Peyronie's Disease.
- If you have problems with your heart. Your doctor should carefully check whether your heart can take the additional strain of having sex.
- If you currently have a stomach ulcer, or a bleeding problem (such as haemophilia).
- If you experience sudden decrease or loss of vision, stop taking **MOMINT®** and

contact your doctor immediately. You should not use **MOMINT®** with any other oral or local treatments for erectile dysfunction.

You should not use **MOMINT®** with treatments for pulmonary arterial hypertension (PAH) containing sildenafil or any other PDE5 inhibitors. You should not take **MOMINT®** if you do not have erectile dysfunction. You should not take **MOMINT®** if you are a woman.

Special considerations for patients with kidney or liver problems

You should tell your doctor if you have kidney or liver problems. Your doctor may decide on a lower dose for you.

Children and adolescents

MOMINT® should not be given to individuals under the age of 18.

c. Taking other medicines, herbal or dietary supplements:

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.

MOMINT® tablets may interfere with some medicines, especially those used to treat chest pain. In the event of a medical emergency, you should tell your doctor, pharmacist or nurse that you have taken

MOMINT® and when you did. Do not take **MOMINT®** with other medicines unless your doctor tells you that you can.

You should not take **MOMINT®** if you are taking medicines called nitrates, as the combination of these medicines may lead to a dangerous fall in your blood pressure. Always tell your doctor, pharmacist or nurse if you are taking any of these medicines that are often used for the relief of angina pectoris (or "chest pain").

You should not take **MOMINT®** if you are using any of the medicines known as nitric oxide donors such as amyl nitrite ("poppers") as the combination may also lead to a dangerous fall in your blood pressure.

Tell your doctor or pharmacist if you are already taking riociguat.

If you are taking medicines known as protease inhibitors, such as for the treatment of HIV, your doctor may start you on the lowest dose (25 mg) of **MOMINT®**.

Some patients who take alpha-blocker therapy for the treatment of high blood pressure or prostate enlargement may experience dizziness or light-headedness, which may be caused by low blood pressure upon sitting or standing up quickly. Certain patients have experienced these symptoms when taking **MOMINT®** with alpha-blockers. This is most likely to happen within 4 hours after taking **MOMINT®**. To reduce the chance that these symptoms might happen, you should be on a regular daily dose of your alpha-blocker before you start **MOMINT®**. Your doctor may start you on a lower dose (25 mg) of **MOMINT®**.

MOMINT® with food and drink and alcohol

MOMINT® can be taken with or without food. However, you may find that **MOMINT®** takes longer to start working if you take it with a heavy meal.

Drinking alcohol can temporarily impair your ability to get an erection. To get the maximum benefit from your medicine, you are advised not to drink excessive amounts of alcohol before taking **MOMINT®**.

e. Pregnancy and breast-feeding: **MOMINT®** is not indicated for use by women.

f. Driving and using machines:

MOMINT® can cause dizziness and can affect vision. You should be aware of how you react to **MOMINT®** before you drive or use machinery.

g. Important information about some of the ingredients of **MOMINT®:**

If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, such as lactose, contact your doctor before taking **MOMINT®**.

3. How to take **MOMINT®**

Always take this medicine exactly as your

doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

The recommended starting dose is 50 mg. You should not take **MOMINT®** more than once a day.

If you feel that the effect of **MOMINT®** is too strong or too weak, talk to your doctor or pharmacist.

MOMINT® will only help you to get an erection if you are sexually stimulated. The amount of time.

MOMINT® takes to work varies from person to person, but it normally takes between half an hour and one hour. You may find that **MOMINT®** takes longer to work if you take it with a heavy meal.

If **MOMINT®** does not help you to get an erection, or if your erection does not last long enough for you to complete sexual intercourse you should tell your doctor.

If you take more **MOMINT® than you should**

You may experience an increase in side effects and their severity. Doses above 100 mg do not increase the efficacy.

You should not take more tablets than your doctor tells you to.

Contact your doctor if you take more tablets than you should.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor, pharmacist or nurse.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects although not everybody gets them. The side effects reported in association with the use of **MOMINT®** are usually mild to moderate and of a short duration.

If you experience any of the following serious side effects stop taking **MOMINT®** and seek medical help immediately:

- An allergic reaction - this occurs uncommonly (may affect up to 1 in 100 people):

Symptoms include sudden wheeziness, difficulty in breathing or dizziness, swelling of the eyelids, face, lips or throat.

- Chest pains - this occurs uncommonly if this occurs during or after intercourse
- Get in a semi-sitting position and try to relax.

- Do not use nitrates to treat your chest pain.
- Prolonged and sometimes painful erections - this occurs rarely (may affect up to 1 in 1,000 people):

If you have an erection which lasts for more than 4 hours, you should contact a doctor immediately.

- A sudden decrease or loss of vision - this occurs rarely.
- Serious skin reactions - this occurs rarely.

Symptoms may include severe peeling and swelling of the skin, blistering of the mouth, genitals and around the eyes, fever.

- Seizures or fits - this occurs rarely

Other side effects:

Very common (may affect more than 1 in 10 people): headache.

Common (may affect up to 1 in 10 people): nausea, facial flushing, hot flush (symptoms include a sudden feeling of heat in your upper body), indigestion, colour tinge to vision, blurred vision, visual disturbance, stuffy nose and dizziness.

Uncommon (may affect up to 1 in 100 people): vomiting, skin rash, eye irritation, bloodshot eyes / red eyes, eye pain, seeing flashes of light, visual brightness, light sensitivity, watery eyes, pounding heartbeat, rapid heartbeat, high blood pressure, low blood pressure, muscle pain, feeling sleepy, reduced sense of touch, vertigo, ringing in the ears, dry mouth, blocked or stuffy sinuses, inflammation of the lining of the nose (symptoms include runny nose, sneezing and stuffy nose), upper abdominal pain, gastro-oesophageal reflux disease (symptoms include heartburn), presence of blood in urine, pain in the arms or legs, nosebleed, feeling hot and feeling tired.

Rare (may affect up to 1 in 1,000 people): fainting, stroke, heart attack, irregular heartbeat, temporary decreased blood flow to parts of the brain, feeling of tightening of the throat, numb mouth, bleeding at the back of the eye, double vision, reduced sharpness of vision, abnormal sensation in the eye, swelling of the eye or eyelid, small particles or spots in your vision, seeing

halos around lights, dilation of the pupil of the eye, discolouration of the white of the eye, penile bleeding, presence of blood in semen, dry nose, swelling of the inside of the nose, feeling irritable and sudden decrease or loss of hearing.

From post-marketing experience cases of unstable angina (a heart condition) and sudden death have been reported rarely. Of note, most, but not all, of the men who experienced these side effects had heart problems before taking this medicine. It is not possible to determine whether these events were directly related to **MOMINT®**.

Reporting of suspected adverse reactions

Website: jpc@jfda.jp

The link to the electronic reporting on JFDA website (www.jfda.com):

<https://primaryreporting.who-umc.org/JO>

Tel: +962-6-5632000

rapid response number QR Code:



5. How to store **MOMINT®**

- Keep out of the reach and sight of children.

- Do not store above 30°C.

- Do not use **MOMINT®** after the expiry date which is stated on the carton after Exp. The expiry date refers to the last day of that month.

- **MOMINT®** does not require any special storage conditions.

- Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

6. Further information

a. What **MOMINT®** contains

The active substance is sildenafil citrate.

MOMINT® 25: Each Chewable tablet contains 25mg sildenafil as sildenafil citrate in packs of 4, 10 & 30 tablets.

MOMINT® 50: Each Chewable tablet contains 50mg sildenafil as sildenafil citrate in packs of 4 & 8 tablets.

MOMINT® 100: Each Chewable tablet contains 100mg sildenafil as sildenafil citrate in packs of 4 & 8 tablets.

The other ingredients are: Silica, colloidal Anhydrous, ludipress LCE powder, Aspartame powder, croscarmellose sodium, peppermint flavor powder, magnesium stearate, polacrillin potassium.

b. What **MOMINT® looks like and contents of the pack**

- **Pharmaceutical form:** Chewable Tablets for oral use.

- Physical Description:

• **MOMINT® 25mg:** white triangular biconvex tablet engraved with (TQ) on one side and plain on the other side.

• **MOMINT® 50mg:** white triangular biconvex tablet engraved with (TQ) on one side and plain on the other side.

• **MOMINT® 100mg:** white triangular biconvex tablet engraved with (TQ) on one side and plain on the other side.

MOMINT® is supplied in PVC /PCTFE - Aluminum Blister, in carton box with a folded leaflet.

c. Marketing Authorisation Holder and Manufacturer

Al-Taqaddom Pharmaceutical Industries

Almwaqar - Amman, Jordan

Tel.: +962-6-4050092

P.O. Box: 1019 Amman 11947 Jordan

Email: info@tqpharma.com

D. This leaflet was last approved in 08/2023 version number 1-Momint-MMT-LMO-R2/AE

This is a medicament

• A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.

• Follow exactly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.

• The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.

• Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.

• Do not repeat the same prescription without consulting your doctor

• Keep medicament out of the reach of children.

COUNCIL OF ARAB HEALTH MINISTERS
UNION OF ARAB PHARMACEUTICALS

مومينت

على حبة حبات سيلدينافيل

PHARMA
Total Quality
شركة التقدم للصناعات الدوائية
Al-Taqaddum Pharmaceutical Industries

بمجموعات

قيم بقرامة هذه النشرة جيداً قبل استعمال أو تناول هذا الدواء

- احتفظ بهذه النشرة، لأنك قد تحتاج إليها لاحقاً.
- في حال كانت لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المستحضر فم باستشارة الطبيب أو الصيدلي.
- إن هذا الدواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناءً على وصفة طبية، وهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سيؤ أن عانيت منها.
- قم بالاتصال بطبيبك للمعالجة أو الصيدلي في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الإصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

تحتوي هذه النشرة على:

1. ما هو مومينت وما هي دواعي استعماله.
2. قبل القيام بتناول أو استعمال مومينت.
3. طريقة استعمال مومينت.
4. الأعراض الجانبية المحتملة.
5. ظروف تخزين مومينت.
6. معلومات إضافية.

1. ما هو مومينت وما هي دواعي استعماله:

يحتوي مومينت على المادة الفعالة سيلدينافيل والتي تنتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى مثبطات فسفودايستراز (PDE5)، حيث إنه يعمل عن طريق المساعدة على استرخاء الأوعية الدموية في عضلات، مما يسمح بتدفق الدم إلى عضلات عندما تكون محفز جنسياً. سوف يساعد مومينت في الحصول على الانتصاب فقط إذا تم تحفيز جنسياً.

مومينت هو علاج للرجال البالغين الذين يعانون من ضعف الانتصاب، والذي يُعرف أحياناً بالعجز الجنسي. يحدث هذا عندما لا يتمكن الرجل من الحصول على ذئب منتصب صلب مناسب للتشاط الجنسي أو الحفاظ عليه.

2. قبل القيام بتناول أو استعمال مومينت:

- أ. لا تأخذ مومينت،
 - إذا كنت تعاني من حساسية تجاه السيلدينافيل أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء.
 - إذا كنت تتناول أدوية تسمى النترات، فقد يؤدي تناولها مع مومينت إلى انخفاض خطر في ضغط الدم. أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أي من هذه الأدوية التي غالباً ما تُعطى لتخفيف من الذئبة الصدرية (أو "آلم الصدر")، إذا لم تكن متأكدًا، اسأل طبيبك أو الصيدلي.
 - إذا كنت تستخدم أي من الأدوية المعروفة باسم مانح أكسيد النتريك مثل نترات أميل، فقد يؤدي ذلك في تفاقم مومينت أيضاً إلى انخفاض خطر في ضغط الدم.
 - إذا كنت تتناول علاج ريكوفيت، يستخدم هذا الدواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (أي ارتفاع ضغط الدم في الرئتين) وارتفاع ضغط الدم الرئوي الإصمامي الخثاري المزمن (أي ارتفاع ضغط الدم في الرئتين نتيجة لتصلب الدم). ثبت أن مثبطات فسفودايستراز مثل مومينت تزيد من التأثيرات الخافضة للضغط لهذا الدواء، إذا كنت تتناول علاج ريكوفيت أو لم تكن متأكدًا أخبر طبيبك.
 - إذا كنت تعاني من مشكلة خطيرة في القلب أو الكبد.
 - إذا أصبحت مؤخراً بسكتة دماغية أو نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم.
 - إذا كنت تعاني من بعض أمراض العين الوراثية النادرة (مثل التهاب الشبكية الصباغي).
 - إذا كنت تعاني من قبل من فقدان البصر بسبب اعتلال العصب البصري الإقفاري الانحامي غير الشرياني (NAION).

ب. الاحتياطات عند استعمال مومينت:

- تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة قبل تناول مومينت
- إذا كنت تعاني من فقر الدم المتجلي (خلل في خلايا الدم الحمراء)، سرطان الدم (سرطان خلايا الدم)، المايولوما المتعددة (سرطان نخاع العظام).
- إذا كان لديك تشوه في عضلات أو مرض يوريني.
- إذا كان لديك مشاكل في قلبك، يجب أن يتحقق طبيبك بعناية مما إذا كان قلبك يمكنه تحمل الضغط الإضافي.

- لممارسة الجنس.
- إذا كنت تعاني حالياً من قرحة في المعدة أو مشاكل نزيف (مثل الهيموفيليا).
- إذا كنت تعاني من نقص أو خسارة مفاجئة من الرؤية، توقف عن تناول مومينت واتصل بطبيبك على الفور.
- يجب عدم استخدام مومينت مع أي علاجات ضوئية أو محمية أخرى لضف الانتصاب.
- يجب عدم استخدام مومينت مع علاجات ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (PAH) التي تحتوي على السيلدينافيل أو أي مثبطات PDE5 أخرى.
- يجب ألا تتناول مومينت إذا لم يكن لديك ضعف في الانتصاب.
- لا يجب تناول علاج مومينت من قبل النساء.

اعتبارات خاصة لمرضى الكلى أو الكبد:

يجب أن تعير طبيبك إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى أو الكبد، قد يقرر طبيبك على الأقل جرعة لك.

الأطفال والمراهقون:

لا ينبغي إعطاء مومينت للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

ج. أخذ هذا المستحضر مع أي أدوية أخرى أو أعشاب أو مكملات غذائية:

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي أدوية أخرى.

قد تتداخل أفراس مومينت مع بعض الأدوية، خاصة تلك المستخدمة لعلاج آلام الصدر. في حالة الطوارئ، يجب أن تعير طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة إذا كنت تتناول مومينت وسمي تناولها، لا تتناول مومينت مع أدوية أخرى ما لم يخبرك طبيبك أنه يمكنك ذلك.

يجب ألا تتناول علاج مومينت إذا كنت تتناول أدوية تسمى النترات، حيث أن الجمع بين هذه الأدوية قد يؤدي إلى انخفاض خطر في ضغط الدم، دائماً أخبر طبيبك أو الصيدلي أو ممرضة إذا كنت تتناول أي من هذه الأدوية أو التي غالباً ما تستخدم لتخفيف من الذئبة الصدرية (أو "آلم الصدر").

يجب ألا تتناول مومينت إذا كنت تستخدم أي من الأدوية المعروفة باسم مانح أكسيد النتريك مثل نترات أميل ("poppers") لأن هذا المزيج قد يؤدي أيضاً إلى انخفاض خطر في ضغط الدم.

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول ريكوفيت أو تأخذ.

إذا كنت تتناول أدوية تصرف باسم مثبطات الأترينج البروتيني، مثل علاج فيروس نقص المناعة البشرية، فقد يبدأ طبيبك بأدنى جرعة (20 ملغم) من علاج مومينت.

قد يعاني بعض المرضى الذين يتناولون علاج حاصرات ألفا لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو تضخم البروستات من الدوار أو غثرة الرأس، والتي قد تكون ناتجة عن انخفاض ضغط الدم عند الجلوس أو الوقوف بسرعة. عانى بعض المرضى من هذه الأعراض عند تناول مومينت مع حاصرات ألفا، من المرجح أن يحدث هذا في غضون 4 ساعات بعد تناول مومينت. لتقليل فرصة حدوث هذه الأعراض، يجب أن تتناول جرعة يومية منتظمة من حاصرات ألفا قبل أن تبدأ تناول علاج مومينت. قد يبدأ طبيبك بجرعة قليلة (20 ملغم) من علاج مومينت.

د. تناول مومينت مع الطعام والشراب:

يمكن تناول مومينت مع الطعام أو بدون، ومع ذلك، قد تجد أن مومينت يستغرق وقتاً أطول ليبدأ العمل إذا تناولته مع وجبة دسمة.

شرب الكحول يمكن أن يضعف مؤقتاً قدرتك على الانتصاب. للحصول على أفضل فائدة من دوائك، يُنصح بعدم شرب كميات كبيرة من الكحول قبل تناول مومينت.

هـ. الحمل والرضاعة:

لا يوصف مومينت للاستخدام من قبل النساء.

و. القيادة واستخدام الآلات:

يمكن أن يسبب مومينت الدوار ويمكن أن يؤثر على الرؤية. يجب أن تكون على دراية بكمية تأثير مومينت عليك قبل القيادة أو استخدام الآلات.

ز. معلومات هامة عن بعض مكونات مومينت

إذا أخبرك طبيبك أنك لا تتحمل بعض السكريات، مثل اللاكتوز، فاطصل بطبيبك قبل تناول مومينت.

3. استعمال مومينت:

احرص دائماً على تناول هذا الدواء تماماً كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا لم

تكن متأكدًا.

جرعة البدء الموصى بها هي 50 ملغم.

يجب ألا تتناول مومينت أكثر من مرة في اليوم.

إذا شمرت أن تأثير مومينت قوتي جداً أو ضعيف جداً، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي.

سوف يساعدك مومينت في الحصول على الانتصاب فقط إذا لم تخمرك جنسياً، مقدار الوقت.

يختلف عمل مومينت من شخص لآخر، لكنه عادة ما يستغرق ما بين نصف ساعة وساعة، قد تجد أن مومينت يستغرق وقتاً أطول في العمل إذا تناولته مع وجبة ثقيلة.

إذا لم يساعدك مومينت في الحصول على الانتصاب، أو إذا لم يستمر الانتصاب لفترة كافية لإتمام الجماع الجنسي، يجب عليك إخبار طبيبك.

إذا تناولت علاج مومينت أكثر مما ينبغي

قد تواجه زيادة في الآثار الجانبية وشدها، الجرعات التي تزيد عن 100 ملغم لا تزيد من الفعالية.

يجب ألا تتناول أفراساً أكثر مما أخبرك طبيبك بذلك، اتصل بطبيبك أو أي تشارك أفراساً أكثر مما ينبغي.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة.

4. الأعراض الجانبية المحتملة:

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية على الرغم من عدم حدوثها للجميع. الآثار الجانبية المبلغ عنها مع استخدام مومينت عادة ما تكون خفيفة إلى معتدلة وتضيق المدة.

إذا واجهت أيًا من الآثار الجانبية الخطيرة التالية، فتوقف عن تناول مومينت واطلب المساعدة الطبية على الفور:

• رد فعل تحسسي - يحدث هذا بشكل غير شائع (قد يؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 100 شخص)؛

تعمل الأعراض أزيزاً مفاجئاً وصعوبة في التنفس أو دواراً وتورم الوجه والوجه والفتحتين أو الحلق.

• رد فعل تحسسي - يحدث هذا بشكل غير شائع (قد يؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 100 شخص)؛

تعمل الأعراض أزيزاً مفاجئاً وصعوبة في التنفس أو دواراً وتورم الوجه والوجه والفتحتين أو الحلق.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

• آلام في الصدر - تحدث بشكل غير شائع إذا حدث ذلك أثناء الجماع أو بعده.

الفاحين. من الجدير بالذكر أن معظم الرجال الذين عانوا من هذه الآثار الجانبية، وليس جميعهم، يعانون من مشاكل في القلب قبل تناول هذا الدواء، لا يمكن تحديد ما إذا كانت هذه الأحداث مرتبطة مباشرة ب مومينت.

إذا أصبح أي من الآثار الجانبية خطيراً، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

للاطلاع عن الآثار الجانبية

البريد الإلكتروني: jpc@jfda.jo

رابط الإبلع الإلكتروني على موقع المؤسسة

(www.jfda.com)

<https://primaryreporting.who-um.c.org/JO>

الهاتف: +٩٦٢-٦-٥٦٦٣٠٠٠

رقم الاستجابة السريعة QR Code.



5. ظروف تخزين مومينت:

- احفظ الدواء بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.

- لا تحفظ الدواء في درجة حرارة أعلى من 30°م.

- لا تشتمل مومينت بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على علية الكرتون بعد كلفة EXP. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.

- لا يتخلل مومينت أي ظروف تخزين خاصة.

- لا ينبغي أن يتم التخلص من الأدوية من خلال مياه الصرف الصحي أو التفتاليت المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد لازمة. ومن شأن هذه التدابير أن تساعد على حماية البيئة.

6. معلومات إضافية:

- المادة الفعالة هي سترات السيلدينافيل.

مومينت ٢٥ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ٢٥ ملغم سيلدينافيل على هيئة سيترات السيلدينافيل في عيوت من ١٠٠ و ٣٠ قرصاً.

مومينت ٥٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ٥٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.

مومينت ١٠٠ ملغم: يحتوي كل قرص قابل للمضغ على ١٠٠ ملغم سيلدينافيل على شكل سيترات السيلدينافيل في عيوت من ٨ و ٤ قرصاً.