

PLATLOC

Clopidogrel 75 mg (as Clopidogrel bisulfate)
Film coated tablet

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

1. What **Platloc** is and what it is used for
2. Before you take **Platloc**
3. How to take **Platloc**
4. Possible side effects
5. How to store **Platloc**
6. Further information

1. What **Platloc** is and what it is used for

Platloc contains clopidogrel and belongs to a group of medicines called antiplatelet medicinal products. Platelets are very small structures in the blood which clump together during blood clotting. By preventing this clumping, antiplatelet medicinal products reduce the chances of blood clots forming (a process called thrombosis).

Therapeutic indications

Platloc is taken by adults to prevent blood clots (thrombi) forming in hardened blood vessels (arteries), a process known as atherothrombosis, which can lead to atherothrombotic events (such as stroke, heart attack, or death).

You have been prescribed **Platloc** to help prevent blood clots and reduce the risk of these severe events because:

- You have a condition of hardening of arteries (also known as atherosclerosis), and
- You have previously experienced a heart attack, stroke or have a condition known as peripheral arterial disease, or
- You have experienced a severe type of chest pain known as 'unstable angina' or myocardial infarction (heart attack). For the treatment of this condition your doctor may have placed a stent in the blocked or narrowed artery to restore effective blood flow. You should also be given acetylsalicylic acid (a substance present in many medicines used to relieve pain and lower fever as well as to prevent blood clotting) by your doctor.
- You have an irregular heartbeat, a condition called 'atrial fibrillation', and you cannot take medicines known as 'oral anticoagulants' (vitamin K antagonists) which prevent new clots from forming and prevent existing clots from growing. You should have been told that 'oral anticoagulants' are more effective than acetylsalicylic acid or the combined use of **Platloc** and acetylsalicylic acid for this condition. Your doctor should have prescribed **Platloc** plus acetylsalicylic acid if you cannot take 'oral anticoagulants' and you do not have a risk of major bleeding.

2. What you need to know before you take **Platloc**

Do not take **Platloc**

- If you are allergic (hypersensitive) to clopidogrel or any of the other ingredients of this medicine.
- If you have a medical condition that is currently causing bleeding such as stomach ulcer or bleeding within the brain.

- If you suffer from severe liver disease.

If you think any of these apply to you, or if you are in any doubt at all, consult your doctor before taking **Platloc**.

Take special care with **Platloc**:

If any of the situations mentioned below apply to you, you should tell your doctor before taking **Platloc**:

- If you have a risk of bleeding such as:
 - A medical condition that puts you at risk of internal bleeding (such as a stomach ulcer).
 - A blood disorder that makes you prone to internal bleeding (bleeding inside any tissues, organs or joints of your body).
 - A recent serious injury.
 - A recent surgery (including dental).
 - A planned surgery (including dental) in the next seven days.
- If you have had a clot in an artery of your brain (ischaemic stroke) which occurred within the last seven days.
- If you have kidney or liver disease.
- If you have had an allergy or reaction to any medicine used to treat your disease.

While you are taking **Platloc**:

- You should tell your doctor if a surgery (including dental) is planned.
- You should also tell your doctor immediately if you develop a medical condition (also known as Thrombotic Thrombocytopenic Purpura or TTP) that includes fever and bruising under the skin that may appear as red pinpoint dots, with or without unexplained extreme tiredness, confusion, yellowing of the skin or eyes (jaundice).
- If you cut or injure yourself, it may take longer than usual for bleeding to stop. This is linked to the way

your medicine works as it prevents the ability of blood clots to form. For minor cuts and injuries e.g., cutting yourself, shaving, this is usually of no concern. However, if you are concerned by your bleeding, you should contact your doctor straightaway.

- Your doctor may order blood tests.

Children and adolescents

Do not give this medicine to children because it does not work.

Other medicines and **Platloc**

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines, including medicines obtained without a prescription.

Some other medicines may influence the use of **Platloc** or vice versa.

You should specifically tell your doctor if you take

- Oral anticoagulants, medicines used to reduce blood clotting.
- A non-steroidal anti-inflammatory medicine, usually used to treat painful and/or inflammatory conditions of muscle or joints.
- Heparin or any other injectable medicine used to reduce blood clotting.
- Omeprazole, esomeprazole or cimetidine, medicines to treat upset stomach.
- Fluconazole, voriconazole, ciprofloxacin, or chloramphenicol, medicines to treat bacterial and fungal infections.
- Carbamazepine, or oxcarbazepine, medicines to treat some forms of epilepsy.
- Ticlopidine, other antiplatelet agent.
- A selective serotonin reuptake inhibitor (including but not restricted to fluoxetine or fluvoxamine), medicines usually used to treat depression.
- Moclobemide, medicine to treat depression.

If you have experienced severe chest pain (unstable angina or heart attack), you may be prescribed **Platloc** in combination with acetylsalicylic acid, a substance present in many medicines used to relieve pain and lower fever. An occasional use of acetylsalicylic acid (no more than 1,000 mg in any 24 hour period) should generally not cause a problem, but prolonged use in other circumstances should be discussed with your doctor.

Platloc with food and drink

Platloc may be taken with or without food.

Pregnancy and breast-feeding

It is preferable not to take this product during pregnancy.

If you are pregnant or suspect that you are pregnant, you should tell your doctor or your pharmacist before taking **Platloc**. If you become pregnant while taking **Platloc**, consult your doctor immediately as it is recommended not to take clopidogrel while you are pregnant.

You should not breast feed while taking this medicine. If you are breast feeding or planning to breast feed, talk to your doctor before taking this medicine.

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

Driving and using machines

Platloc is unlikely to affect your ability to drive or to use machines.

Important information about some of the ingredients of **Platloc**:

Platloc contains lactose: If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars (e.g. lactose), contact your doctor before taking this medicine.

Platloc contains hydrogenated castor oil: This may cause stomach upset or diarrhea.

3. How to take **Platloc**

Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

If you have experienced severe chest pain (unstable angina or heart attack), your doctor may give you 300 mg of **Platloc** (4 tablets of 75 mg) once at the start of treatment. Then, the recommended dose is one 75 mg tablet of **Platloc** per day to be taken orally with or without food, and at the same time each day.

You should take **Platloc** for as long as your doctor continues to prescribe it.

If you take more **Platloc** than you should

Contact your doctor or the nearest hospital emergency department because of the increased risk of bleeding.

If you forget to take **Platloc**

If you forget to take a dose of **Platloc**, but remember within 12 hours of your usual time, take your tablet straightaway and then take your next tablet at the usual time.

If you forget for more than 12 hours, simply take the next single dose at the usual time. Do not take a double dose to make up for a forgotten tablet. For the 28 and 84 tablets pack sizes, you can check the day on which you last took a tablet of **Platloc** by referring to the calendar printed on the blister.

If you stop taking **Platloc**

Do not stop the treatment unless your doctor tells you so. Contact your doctor or pharmacist before stopping.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Contact your doctor immediately if you experience:

- Fever, signs of infection or extreme tiredness. These may be due to rare decrease of some blood cells.
- Signs of liver problems such as yellowing of the skin and/or the eyes (jaundice), whether or not associated with bleeding which appears under the skin as red pinpoint dots and/or confusion.
- Swelling in the mouth or skin disorders such as rashes and itching, blisters of the skin.

These may be the signs of an allergic reaction.

The most common side effect reported with **Platloc** is bleeding. Bleeding may occur as bleeding in the stomach or bowels, bruising, haematoma (unusual bleeding or bruising under the skin), nose bleed, blood in the urine. In a small number of cases, bleeding in the eye, inside the head, the lung or the joints has also been reported.

If you experience prolonged bleeding when taking **Platloc**.

If you cut or injure yourself, it may take longer than usual for bleeding to stop. This is linked to the way your medicine works as it prevents the ability of blood clots to form. For minor cuts and injuries e.g., cutting yourself, shaving, this is usually of no concern. However, if you are concerned by your bleeding, you should contact your doctor straightaway.

Other side effects include:

Common side effects (may affect up to 1 in 10 people): Diarrhea, abdominal pain, indigestion or heartburn.

Uncommon side effects (may affect up to 1 in 100 people): Headache, stomach ulcer, vomiting, nausea, constipation, excessive gas in stomach or intestines, rashes, itching, dizziness, sensation of tingling and numbness.

Rare side effect (may affect up to 1 in 1000 people): Vertigo.

Very rare side effects (may affect up to 1 in 10,000 people): Jaundice; severe abdominal pain with or without back pain; fever, breathing difficulties sometimes associated with cough; generalised allergic reactions (for example, overall sensation of heat with sudden general discomfort until fainting); swelling in the mouth; blisters of the skin; skin allergy; sore mouth (stomatitis); decrease in blood pressure; confusion; hallucinations; joint pain; muscular pain; changes in taste of food.

In addition, your doctor may identify changes in your blood or urine test results.

If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

5. How to store **Platloc**

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not store above 30°C.

Do not use **Platloc** after the expiry date which is stated on the carton and blister after 'EXP'. The expiry date refers to the last day of that month. Store in the original package in order to protect from moisture.

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

6. Further information

What **Platloc** contains

The active substance is clopidogrel. Each film coated tablet contains Clopidogrel Bisulfate equivalent to 75 mg Clopidogrel.

The other ingredients are: Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, hydroxypropyl methylcellulose, croscopolidone, mannitol, colloidal anhydrous silica, macrogol, hydrogenated castor oil, opadry II pink.

What **Platloc** looks like and contents of the pack

Platloc tablets are pink, round, biconvex, film coated & plain on both sides.

Platloc supplied in packs of 28, 30 and 84 tablets. Hospital pack (1050's) is also available.

Note: Not all pack sizes are available in all countries.

Marketing Authorisation Holder and Manufacturers

Al-Taqaddom Pharmaceutical Industries.

Almwaqqar – Amman, Jordan

Tel.: +962-6-4050092 Fax: +962-6-4050091

P.O. Box: 1019 Amman 11947 Jordan

Email: info@tqpharma.com

Rev. Date: Nov., 2018 I-0080-PLL-LMO-R1/AE

This is a medicament

- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep medicament out of the reach of children.

COUNCIL OF ARAB HEALTH MINISTERS
UNION OF ARAB PHARMACEUTISTS

Al-Taqaddom Pharmaceutical Industries, Amman-Jordan.

TA PHARMA
Total Quality

بلا تلوك

كلويدوجريل ٧٥ ملغم (على شكل كبريتات الكلوييدوجريل)
أقراص مغلقة

قم بقراءة هذه النشرة جيداً قبل استعمال أو تناول هذا الدواء احتفظ بهذه النشرة، لأنك قد تحتاج إليها لاحقاً. في حال كانت لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المستحضر قم باستشارة الطبيب أو الصيدلي. إن هذا الدواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناءً على وصفة طبية، ولهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها. قم بالاتصال بطبيبك المعالج أو الصيدلي في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الإصابة بمرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

تحتوي هذه النشرة على:

١. ما هو **بلا تلوك** و ما هي دواعي استعماله
٢. قبل القيام بتناول أو استعمال **بلا تلوك**
٣. طريقة استعمال **بلا تلوك**
٤. الأعراض الجانبية
٥. ظروف تخزين **بلا تلوك**
٦. معلومات إضافية

١. ما هو بلا تلوك و ما هي دواعي استعماله

المجموعة العلاجية، يحتوي **بلا تلوك** على كلويدوجريل، وينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى الأدوية المضادة للصفائح الدموية. الصفائح الدموية هي جزيئات صغيرة جداً في الدم تتجمع مما خلال عملية تخرثر الدم، يمنع تجمع الصفائح، تقلل الأدوية المضادة للتخثر فرص تشكل جلطات (عملية تسمى التخثر).

الاستخدامات:

يتم تناول **بلا تلوك** من قبل البالغين لمنع تشكل تخثر (جلطة) في الأوعية الدموية المتصلة (الشرايين)، عملية تعرف بالخطر، التي قد يؤدي إلى حالات جلطة الأوعية الدموية (مثل السكتة الدماغية، الأزمة القلبية أو الوفاة).

وصف لك الطبيب بلا تلوك للمساعدة في منع جلطة الدم وتقليل خطورة هذه الأحداث الشديدة وذلك للأسباب التالية:

- إذا كنت تعاني من تصلب الشرايين (يعرف أيضاً بتصلب الأوعية الدموية)، و.
- سبق وأن أصبت بأزمة قلبية، سكتة دماغية أو تعاني من حالة تعرف بمرض الشرايين المحيطية، أو
- سبق وتعرضت لنوع شديد من ألم الصدر يعرف بالذبحة الصدرية غير المستقرة أو إحتشاء عضلة القلب، لعلاج هذه الحالة قد يكون طبيبك قام بوضع دعامة في الشريان المتضيق أو السدود لاستعادة تدفق الدم العال. كما يجب أن تعلمي من قبل طبيبك أيضاً حمض أسيتايل سالياسايليك (هي مادة موجودة في العديد من الأدوية المستعملة لتخفيف الألم وخفض الحرارة و كذلك لمنع جلطة الدم).

- إذا كنت تعاني من عدم انتظام ضربات القلب، و هي حالة تعرف بالرجف الأذيني و لا يمكنك تناول أدوية تسمى مضادات التخثر القوية (مضادات فيتامين ك) و التي تمنع تشكل خثرات جديدة و نمو تلك الموجودة أصلاً. يجب أن يتم إعلامك بأن مضادات التخثر القوية أكثر فاعلية من حمض أسيتايل سالياسايليك أو من الاستعمال المشترك لكل من حمض أسيتايل سالياسايليك و **بلا تلوك** لعلاج هذه الحالة. يتوجب على طبيبك أن يصف لك **بلا تلوك** إضافة إلى حمض أسيتايل سالياسايليك إذا لم يكن بإمكانك تناول مضادات التخثر القوية و لم يكن لديك خطر التعرض لنزف كبير.

٢. قبل القيام بتناول أو استعمال بلا تلوك.

لا تتناول بلا تلوك إذا كنت:

- تعاني من فرط التحسس المعروف لمادة كلويدوجريل أو لأي من السواغات.
- تعاني حالياً من حالة طبية مسببة للنزف مثل قرحة في المعدة أو النزف الدماغي.

• تعاني من مرض شديد في الكبد. إذا كنت تعتقد بأن أي من تلك تطبق عليك، أو كنت في شك، استشر طبيبك قبل تناول **بلا تلوك**.

خذ احتياطاً مع بلا تلوك، إذا كانت أي من الحالات المذكورة أدناه تطبق عليك، فيجب عليك إعلام الطبيب قبل تناول **بلا تلوك**:

- إذا كان هناك احتمالية لحدوث نزف مثل:
- وجود حالة طبية تؤدي لخطر النزف الداخلي (مثل قرحة المعدة).
- اضطراب دموي يجعلك عرضة للنزف الداخلي (نزف داخل أي من الأنسجة، الأعضاء أو مفاصل الجسم).
- تعرضت لإصابة خطيرة حديثاً.
- جراحة حديثة (يما في ذلك جراحة الأسنان).
- جراحة مخطط لها (يما في ذلك جراحة الأسنان) خلال الأيام السبعة المقبلة.
- إذا عانيت من جلطة في إحدى شرايين دماغك (سكتة دماغية) حدثت خلال الأيام السبعة الماضية.

• إذا كنت تعاني من أمراض الكلى أو الكبد. • إذا تعرضت لأي حساسية أو رد فعل اتجاه أي دواء استخدم في علاج مرضك.

أثناء فترة استعمال بلا تلوك، يجب عليك إخبار الطبيب إذا تم التخطيط لعملية جراحية (يما في ذلك جراحة الأسنان).

يجب عليك أيضاً إخبار طبيبك على الفور إذا كنت تعاني من نقص الصفائح التخثرية الأساسية و التي تتضمن حمى و كدمات تحت الجلد قد تظهر على شكل نقاط حمراء، مع أو دون تعب شديد غير مبرر، ارتباك، اصفرار الجلد أو العينين

(اليرقان).

• إذا قمت بجرح نفسك، فإنه قد يستغرق وقتاً أطول من المعتاد لوقف النزف. يعود ذلك إلى طريقة عمل كلويدوجريل في الحيلولة دون تكون جلطات الدم. لا داعي للقلق في حالة الجروح البسيطة على سبيل المثال، جرح نفسك، الحلاقة. ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالقلق إزاء أي نزف، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

• قد يطلب طبيبك إجراء اختبارات للدم.

الاستعمال في الأطفال و المراهقين:

لا تعطي الأطفال هذا الدواء لأنه لا ينجح مع هذه الفئة من المرضى.

تناول أدوية أخرى

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو قد تناولت مؤخراً أية أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية و الأدوية العشبية. وذلك لأن **بلا تلوك** قد يؤثر على طريقة عمل بعض الأدوية أو قد تؤثر بعض الأدوية على طريقة عمل **بلا تلوك**.

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تأخذ بالمثل:

- مضادات التخثر القوية، أدوية تستخدم لتقليل جلطة الدم.
- مضادات الالتهاب اللاستيرويدية. تستخدم عادة لعلاج الألم و/أو حالات التهاب العضلات أو المفاصل.
- الهيبارين أو أي حقن دوائية أخرى تستعمل لتقليل تخثر الدم.
- أوميبرازول، إيسوميبرازول أو سميتيدن، أدوية تستخدم لعلاج اضطرابات المعدة.
- فلوكونازول، فوريكونازول، سيبروفلوكساسين، أو الكلورامفينيكول، أدوية لعلاج الالتهابات البكتيرية و الفطرية.
- كاربامازيبين، أو اوكسكاربازيبين، أدوية لعلاج بعض أشكال الصرع.
- نيكليوبيدين، دواء آخر مضاد للجلطة.
- مثيل استرداد السيروتونين الانتقائي (المضمنة على سبيل الذكر لا الحصر: فلوكسيتين، فلوغوسامين، أدوية تستعمل عادة لعلاج الاكتئاب).
- موكلوبيميد، دواء يستعمل لعلاج الاكتئاب.

إذا عانيت من ألم حادة في الصدر (ذبحة صدرية غير مستقرة أو أزمة قلبية)، فقد يصف لك الطبيب كلويدوجريل بالتزامن مع حمض أسيتايل سالياسايليك، وهو مركب يوجد في كثير من الأدوية يستخدم لتخفيف الحرارة و إزالة الألم. عموماً، فإن الإستعمال العرضي لحمض أسيتايل سالياسايليك (يما لا يزيد على ١٠٠٠٠ ملغم خلال فترة ٢٤ ساعة) لا يسبب مشكلة، ولكن يجب مناقشة إستعماله لفترات طويلة في ظرف أخرى مع الطبيب.

تناول بلا تلوك مع الطعام و الشراب

يمكن أن تتناول **بلا تلوك** مع أو دون الطعام.

الحمل و الرضاعة:

يفضل عدم استعمال كلويدوجريل أثناء فترة الحمل. إذا كنت حاملاً أو تعتنين نفسك حاملاً، فيجب عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي قبل تناول كلويدوجريل. إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول كلويدوجريل فيجب عليك إستشارة طبيبك فوراً، حيث انه لا يوصى باستعمال كلويدوجريل أثناء الحمل. يتوجب عليك عدم إرضاع طفلك رضاعة طبيعية أثناء تناول هذا الدواء. إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية، وتخططين لذلك، تحدثي إلى طبيبك قبل تناوله.

استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

القيادة و استعمال الآلات:

من غير المحتمل أن يؤثر إستعمال كلويدوجريل في قدرتك على القيادة أو إستعمال الآلات.

معلومات هامة عن بعض مكونات بلا تلوك:

إذا أخبرك طبيبك بأنك تعاني من تعصب لبعض أنواع السكريات (على سبيل المثال: لاكتوز)، عليك إستشارة طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

يحتوي **بلا تلوك** على زيت الخروع المهدرج الذي قد يسبب اضطرابات في المعدة أو اسهال.

٣. طريقة تناول بلا تلوك

دائماً، تناول **بلا تلوك** كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي. استشر الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكد. إذا عانيت من ألم حادة في الصدر (ذبحة صدرية غير مستقرة أو إحتشاء عضلة القلب)، قد يعطيك طبيبك ٣٠٠ ملغم من كلويدوجريل (٤ أقراص من **بلا تلوك** ٧٥ ملغم) مرة واحدة في بداية العلاج. بعد ذلك، تبلغ الجرعة الموصى بها قرص واحد من **بلا تلوك** ٧٥ ملغم يومياً يؤخذ عن طريق الفم مع أو دون الطعام. يجب أن يتناول بانتظام و في نفس الوقت كل يوم. يجب تناول **بلا تلوك** للمدة التي يظليها منك الطبيب.

إذا تناولت بلا تلوك أكثر مما يجب

اتصل بالطبيب أو بقسم الطوارئ لأقرب مستشفى، و ذلك بسبب زيادة احتمالية حدوث نزف.

إذا نسيت تناول جرعة بلا تلوك

إذا نسيت تناول جرعة **بلا تلوك**، ولكن تذكرتها في غضون ١٢ ساعة من وقت تناولك المعتاد لها، فتناول جرعتك على الفور وتناول القرص التالي في الوقت المعتاد، إذا نسيت تناوله لأكثر من ١٢ ساعة، ببساطة تناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد، لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعات النسيية.

يمكنك التحقق من آخر يوم تناولت فيه قرص دوالك من **بلا تلوك** بالرجوع إلى الأيام الماضية، على الملف الخلفي للشريط.

إذا توقفت عن تناول بلا تلوك:

يجب عدم وقف العلاج ما لم يغيرك الطبيب أو الصيدلي بذلك. اتصل بالطبيب أو الصيدلي قبل إيقاف العلاج. اسأل الطبيب أو الصيدلي، إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات أخرى عن كيفية استخدام الدواء.

٤. الآثار الجانبية المحتملة:

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب **بلا تلوك** آثاراً جانبية، وإن كانت لا تصيب الجميع.

اتصل بطبيبك على الفور إذا واجهت:

- حمى، علامات الإصابة بالتهابات أو إرهابك شديد، قد يحدث ذلك بسبب إنخفاض نادر لبعض خلايا الدم.
- آثار لمشاكل في الكبد مثل اصفرار الجلد و/أو العينين (اليرقان)، سواء ترافق مع أو دون نزف و الذي يظهر تحت الجلد كنقاط حمراء و/ أو ارتباك.
- تورم في الفم أو اضطرابات جلدية مثل الطلع الجلدي و الحكة، ظهور طفلة على الجلد.

قد تكون هذه علامات رد فعل تحسيسي:

أكثر الأعراض الجانبية شيوعاً و التي تم تسجيلها مع **بلا تلوك** هي حدوث نزف دموي. قد يحدث النزف على شكل نزف في المدة أو الأنف، كدمات، تورم دموي (نزف غير معتاد أو كدمات تحت الجلد)، نزف الأنف، دم في البول. تم أيضاً تسجيل في عدد قليل من الحالات، حدوث نزف في العين، داخل الرأس، الرئة أو المفاصل.

إذا كنت تعاني من حدوث نزف مطول عند تناول **بلا تلوك**، إذا جرحت نفسك، قد يتطلب وقتاً أطول قليلاً من المعتاد لوقف النزف. يرتبط هذا بطريقة عمل الدواء، حيث يقلل من إمكانية تشكل التجلطات الدموية. لا داعي للقلق في حالة الجروح البسيطة على سبيل المثال، جرح نفسك أثناء الحلاقة. ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالقلق إزاء أي نزف، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

تتضمن الآثار الجانبية الأخرى:

- شائعة (قد تصيب ١ من كل ١٠ أشخاص)
- إسهال، ألم في البطن عسر الهضم أو قرحة المعدة.
- غير شائعة (قد تصيب ١ من كل ١٠٠ شخص)
- صداع، قرحة المعدة، قيء، دوار، اسهال، غثاات في المعدة أو الأمعاء، حكة، دوار، الإحساس بالتعب أو الخدر.
- نادرة (قد تصيب ١ من كل ١٠٠٠ شخص): دوار.
- نادرة جداً (قد تصيب ١ من كل ١٠٠٠٠ شخص)
- بقران، آلام شديدة في البطن مع أو دون ألم في الظهر، حمى، صعوبة في التنفس ترتبط أحياناً مع اسهال، رد فعل تحسسي عام (مثل الإحساس العام بالحرارة مع شعور عام مفاجئ بعدم الارتياح حتى الإغماء)، تورم في الفم، طفلة على الجلد، حساسية الجلد، قرحة الفم، انخفاض في ضغط الدم، ارتباك، هلوسة، آلام المفاصل، ألم في العضلات، وتغير في مذاق الطعام بالإضافة إلى ذلك، قد يلحق طبيبك تحيرات أو نتائج فحوصات الدم أو البول.

إذا أصبح أي من الآثار الجانبية خطيراً، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

٥. ظروف تخزين بلا تلوك

احتفظ الدواء بعيداً عن متناول ونظر الأطفال. لا تحفظ الدواء في درجة حرارة أعلى من ٣٠ °م . لا تستعمل **بلا تلوك** بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المدون على علبة الكرتون بعد كلمة Exp. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور. احتفظ الدواء في العلبة الأصلية لحمايته من الرطوبة. لا ينبغي أن يتم التخلص من الأدوية من خلال مياه الصرف الصحي أو التفتيات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد لازمة، ومن شأن هذه التدابير أن تساعد على حماية البيئة.

٦. معلومات إضافية

ما هي محتويات بلا تلوك

المادة الفعالة هي كلويدوجريل على شكل كبريتات الكلوييدوجريل مع يعادل ٧٥ ملغم كلويدوجريل. المكونات الأخرى: لاكتوز، أكراميد، بوليوز، بوليوز دقيق التيلور، هيدروكسي بروبيل ميثيل سلولوز، بوفيدون، ميثاميك، مانitol، سيليكات غروية لامائية، غليكول عديد الإيثيلين، زيت الخروع المهدرج، وبادير ٢ زهري اللون.

ما هو شكل بلا تلوك الصيدلاني و وصفه و حجم عبوته

أقراص **بلا تلوك** زهرية اللون، دائرية الشكل، محدية الوجهين، مغلقة غشائية وكلا وجهيها فارغ. يزود **بلا تلوك** في عبوات سعة ٢٨، ٣٠، ٤٥، ٦٠، ٩٠ قرصاً مغلفاً. عبوة المستشفى (١٠٥٠ قرص) متوفرة أيضاً.

ملاحظة: لا تتوفر جميع العبوات في جميع الأسواق.

اسم و عنوان مالك رخصة التسويق و الصنع

شركة التقدم للصناعات الدوائية
الموقر- عمان، الأردن
هاتف: ٩٦٢ ٠٩٢ ٤٥٠٠-٦
فاكس: ٩٦٢ ٠٩١ ٤٥٠٠-٦
صندوق بريد: ١٠١٩ عمان ١١٩٦٧ الأردن
البريد الإلكتروني: info@tqpharma.com

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر بائز على صحتك واستهلاكه خلافا لتعليمات بعرضك لخطر.
- أتبع بدقة وصفة وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- إن الطبيب و الصيدلي هما اللذان يبداء الدواء ويضعه وصره .
- لا تلعغ مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- أحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

محضر ومنقولة بواسطة
إدارة الصيدلة العرب

شركة التقدم للصناعات الدوائية،
عمان - الأردن

PHARMA
Total Quality