

Sulfi

solifenacin succinate



Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine:

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

1. What Sulfi® is and what it is used for.
2. Before you take Sulfi®.
3. How to take Sulfi®.
4. Possible side effects.
5. How to store Sulfi®.
6. Further information.

1. What Sulfi® is and what it is used for:

Pharmacotherapeutic group:
The active substance of Sulfi® belongs to the group of anticholinergics. These medicines are used to reduce the activity of an overactive bladder. This enables you to wait longer before having to go to the bathroom and increases the amount of urine that can be held by your bladder.

Therapeutic indications:

Sulfi® is used to treat the symptoms of a condition called overactive bladder. These symptoms include: having a strong, sudden urge to urinate without prior warning, having to urinate frequently or wetting yourself because you could not get to the bathroom in time.

2. Before you take Sulfi®

a. Do not Take Sulfi®:

- if you have an inability to pass water or to empty your bladder completely (urinary retention).
- if you have a severe stomach or bowel condition (including toxic megacolon, a complication associated with ulcerative colitis).
- if you suffer from the muscle disease called myasthenia gravis, which can cause an extreme weakness of certain muscles.
- if you suffer from increased pressure in the eyes, with gradual loss of eye sight (glaucoma).
- if you are allergic to solifenacin or any of the other ingredients of this medicine.
- if you are undergoing kidney dialysis.
- if you have severe liver disease.
- if you suffer from severe kidney disease or moderate liver disease and at the same time are being treated with medicines that may decrease the removal of Sulfi® from the body (for example, ketoconazole). Your doctor or pharmacist will have informed you if this is the case.

- Inform your doctor if you have or ever had any of the above mentioned conditions before treatment with Sulfi® starts.
- b. Take special care with Sulfi®:**
 - if you have trouble emptying your bladder (bladder obstruction) or have difficulty in passing urine (e.g. a thin urine flow). Risk of accumulation of urine in the bladder (urinary retention) is much higher.
 - if you have some obstruction of the digestive system (constipation).
 - if you are at risk of your digestive system slowing down (stomach and bowel movements). Your doctor will have informed you if this is the case.

- if you suffer from severe kidney disease.
- if you have moderate liver disease.
- if you have a stomach tear (hiatus hernia) or heartburn.
- if you have a nervous disorder (autonomic neuropathy).

Sulfi® is not to be used in children or adolescents under 18 years. Before starting Sulfi®, your doctor will assess whether there are other causes for your need to pass urine frequently (for example heart failure (insufficient pumping power of the heart) or kidney disease). If you have a urinary tract infection, your doctor will prescribe you an antibiotic (a treatment against particular bacterial infections).

c. Taking other medicines, herbal or dietary supplements:

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines. This includes medicines that you can buy without a prescription, including herbal medicines. This is because Sulfi® can affect the way that some other medicines work and some other medicines can affect the way that Sulfi® works.

It is especially important to inform your doctor if you are taking:

- other anticholinergic medicines, effects and side effects of both medications can be enhanced.
- cholinergics as they can reduce the effect of Sulfi®.
- medicines, like metoclopramide and cisapride, which make the digestive system work faster. Sulfi® can reduce their effect.
- medicines, like ketoconazole, ritonavir, nelfinavir, itraconazole, verapamil and diltiazem, which decrease the rate at which Sulfi® is broken down by the body.
- medicines like rifampicin, phenytoin and carbamazepine, as they may increase the rate at which Sulfi® is broken down by the body.
- medicines such as bisphosphonates, that can cause or exacerbate inflammation of the gut (oesophagitis).

d. Taking Sulfi® with food and drink:

Sulfi® can be taken with or without food, depending on your preference.

e. Pregnancy and breast-feeding:
You should not use Sulfi® if you are pregnant unless clearly necessary. Do not use Sulfi® if you are breast-feeding as solifenacin may get into your breast milk.

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

f. Driving and using machines:

Sulfi® may cause blurred vision and sometimes sleepiness or tiredness. If you suffer from any of these side effects, do not drive or operate machinery.

g. Important information about some of the ingredients of Sulfi®:

Sulfi® contains lactose. If you have been told by your doctor that you have a rare hereditary problem of galactose intolerance, Lapp lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption you should not use this medicine.

3. How to take Sulfi®

Instructions for proper use

- Always take Sulfi® exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

- You should swallow the whole tablet with some liquid. It can be taken with or without food, according to your preference. Do not crush the tablets.

- The usual dose is 5 mg per day, unless your doctor told you to take 10 mg per day.

If you take more Sulfi® than you should

If you have taken too much Sulfi® or if a child has accidentally taken Sulfi®, contact your doctor or pharmacist immediately.

Symptoms of overdose may include: headache, dry mouth, dizziness, drowsiness and blurred vision, perceiving things that are not there (hallucinations), over-excitability, seizures (convulsions), difficulty breathing, elevated heart rate (tachycardia), accumulation of urine in the bladder (urinary retention) and dilated pupils (mydriasis).

If you forget to take Sulfi®

If you forget to take a dose at the usual time, take it as soon as you remember, unless it is time to take your next dose. Never take more than one dose per day. If you are in doubt, always consult your doctor or pharmacist.

If you stop taking Sulfi®

If you stop taking Sulfi®, your symptoms of overactive bladder may return or worsen. Always consult your doctor, if you are considering stopping the treatment.

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

If you experience an allergic attack, or a severe skin reaction (e.g. blistering and peeling of the skin), you must inform your doctor or pharmacist immediately.

Angioedema (skin allergy that results in the swelling that occurs in the tissue just below the surface of the skin) with airway obstruction (difficulty in breathing) has been reported in some patients on solifenacin succinate (Sulfi®). If angioedema occurs, solifenacin succinate (Sulfi®) should be discontinued immediately and appropriate therapy and/or measures should be taken.

Sulfi® may cause the following other side effects:

Very common (may affect more than 1 in 10 people)

• dry mouth.

Common (may affect up to 1 in 10 people)

- blurred vision.
- constipation, nausea, indigestion with symptoms such as abdominal fullness, abdominal pain, burping, nausea, and heartburn (dyspepsia), stomach discomfort.

Uncommon (may affect up to 1 in 100 people)

- urinary tract infection, bladder infection.
- sleepiness, impaired sense of taste (dysgeusia).
- dry (irritated) eyes.
- dry nasal passages.
- reflux disease (gastro-oesophageal reflux), dry throat.
- dry skin.
- difficulty in passing urine.
- tiredness, accumulation of fluid in the lower legs (oedema).
- Rare (may affect up to 1 in 1,000 people)
- lodging of a large amount of hardened stool in the large intestine (faecal impaction).
- build up of urine in the bladder due to inability to empty the bladder (urinary retention).
- dizziness, headache.
- vomiting.
- itching, rash.
- Very rare (may affect up to 1 in 10,000 people)
- hallucinations, confusion.
- allergic rash

Not known (frequency cannot be estimated from the available data).

- decreased appetite, high levels of

blood potassium which can cause abnormal heart rhythm.

- increased pressure in the eyes.
- changes in the electrical activity of the heart (ECG), irregular heartbeat (Torsade de Pointes), feeling your heartbeat, faster heart beat.
- voice disorder.
- liver disorder.
- muscle weakness.
- renal disorder.

If any of the side effects gets serious or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

5. How to store Sulfi®

- Keep out of the reach and sight of children.

- Do not store above 30°C.

- Do not use Sulfi® after the expiry date which is stated on the carton after Exp. The expiry date refers to the last day of that month.

- Sulfi® does not require any special storage conditions.

- Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

6. Further information

a. What Sulfi® contains

- The active substance is Solifenacin succinate.

Sulfi® 5: Each film coated tablet contains 5mg Solifenacin succinate.

Sulfi® 10: Each film coated tablet contains 10mg Solifenacin succinate.

- The other ingredients are: Lactose Monohydrate, Maize Starch, Magnesium Stearate and Opady Yellow.

b. What Sulfi® looks like and contents of the pack

- Pharmaceutical form: film coated tablet

- Physical Description:

- Sulfi® 5: Light yellow, round, biconvex film-coated tablets containing 5 mg of Solifenacin Succinate.

- Sulfi® 10: Light pink, round, biconvex film-coated tablets with score line on one side and plain on the other, containing 10 mg of Solifenacin Succinate.

Is available in the pack size of 30 film coated tablet

Sulfi® is supplied in PVC/PE/PVDC-Aluminum Blister, in carton box with a folded leaflet.

c. Marketing Authorisation Holder and Manufacturer

Al-Taqaddom Pharmaceutical Industries

Almwaqqar – Amman, Jordan

Tel.: +962-6-4050092

Fax: +962-6-4050091

P.O. Box: 1019 Amman 11947 Jordan

Email: info@tqpharma.com

d. This leaflet was last approved in 4/2017 version number I-Sulfi-SFI-LMO-RO/AE

This is a medicament

- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor
- Keep medicament out of the reach of children.

COUNCIL OF ARAB HEALTH MINISTERS
UNION OF ARAB PHARMACISTS

سولفي

سوليفيناسين ساكسينات

PHARMA
Total Quality
شركة التقدم للصناعات الدوائية
Al-Taqadom Pharmaceutical Industries

قم بقراءة هذه النشرة جيداً قبل استعمال أو تناول هذا الدواء،

- احتفظ بهذه النشرة، لأنك قد تحتاج إليها لاحقاً
- في حال كانت لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المستحضر قم باستشارة الطبيب أو الصيدلي.
- إن هذا الدواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناء على وصفة طبية، ولهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها.
- قم بالاتصال بطبيبك المعالج أو الصيدلي في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الإصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

تحتوي هذه النشرة على،

١. ما هو سولفي وما هي دواعي استعماله.
٢. قبل القيام بتناول أو استعمال سولفي.
٣. طريقة استعمال سولفي.
٤. الأعراض الجانبية المحتملة.
٥. ظروف تخزين سولفي.
٦. معلومات إضافية.

١. ما هو سولفي وما هي دواعي استعماله:

للمجموعة العلاجية:

تنتمي المادة الفعالة الموجودة في سولفي إلى مجموعة مضادات الأسيتيل كولين. تُستخدم أدوية هذه المجموعة في تقليل نشاط المثانة مفرطة النشاط مما يُمكنك من الانتظار لوقت أطول قبل الحاجة للذهاب للحمام للتبول ويزيد من كمية البول المخرجة على المثانة.

الاستخدامات العلاجية:

يُستخدم سولفي لعلاج أعراض الحالة المعروفة باسم المثانة مفرطة النشاط. تشمل هذه الأعراض على ما يلي: رغبة قوية ومُتكررة للتبول بدون سابق إنذار، الحاجة للتبول مرات متعددة كثيرة أو حدوث سلس بولي بسبب عدم التحكم من الوصول للحمام في وقت مناسب.

٢. قبل القيام بتناول أو استعمال سولفي،

- أ. لا تأخذ سولفي،
 - لو كنت غير قادر على التبول أو على إفراغ المثانة بالكامل (احتباس بولي).
 - لو كنت تعاني من حالة معدية أو معدية شديدة (تشمل تضخم القولون النسمي وهو أحد مضاعفات التهاب القولون التقرحي).
 - لو كنت تعاني من الوهن العضلي الوبيل والذي قد يسبب ضعف شديد في عضلات معينة.
 - لو كنت تعاني من ارتفاع ضغط العين مصحوب بفقدان تدريجي للبصر (جلوكوما).
 - لو كنت تعاني من حساسية مفرطة لحادة سوليفيناسين أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء.
 - لو كنت تجري عملية الديليزة (غسيل الكلى).
 - لو كنت تعاني من مرض شديد بالكبد.
 - لو كنت تعاني من مرض شديد بالكلى أو مرض متوسط الشدة بالكبد. وفي نفس الوقت تُعالج بأدوية تقلل من طرح سولفي من الجسم (مثل كيتوكونازول) إذا كانت هذه حالتك فُسوف يخبرك الطبيب أو الصيدلي بهذا.
 - اخبر طبيبك لو كنت تعاني أو قد عانيت في السابق من أحد الحالات المذكورة أعلاه قبل بدء العلاج باستخدام سولفي.

ب. الاحتياطات عند استعمال سولفي:

- لو كنت تعاني من صعوبة في تفريغ المثانة (استسداد بالمثانة) أو صعوبة في التبول (ضعف تيار البول) في هذه الحالة هناك احتمال قوي أن تعترض لتراكم البول في المثانة (احتباس بولي).
- لو كنت تعاني من استسداد في القناة الهضمية (إمساك).
- لو كان لديك احتمال زائد للإصابة ببطء نشاط القناة الهضمية (حركة المعدة والأمعاء). لو كانت هذه حالتك فُسوف يخبرك طبيبك بهذا.
- لو كنت تعاني من مرض شديد بالكلى

- لو كنت تعاني من مرض متوسط الشدة بالكبد.
- لو كنت تعاني من تمرق بالمعدة (هق) فرجوي) أو حرقان بالمعدة.
- لو كنت تعاني من مرض عصبي (اختلال بالجهاز العصبي اللاإرادي)
- لا يستخدم سولفي في الأطفال أو المراهقين الأقل من ١٨ سنة.
- قبل بدء العلاج باستخدام سولفي، سوف يُقيم طبيبك حالتك لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب أخرى تسبب لك زيادة عدد مرات التبول (مثل هبوط القلب "ضعف قوة دفع القلب" أو مرض بالكلى) لو كنت تعاني من التهاب في المسالك البولية، فُسوف يصف لك طبيبك أحد المضادات الحيوية (علاج مضاد للالتهابات البكتيرية).

ج. أخذ هذا المستحضر مع أي أدوية أخرى أو أعشاب أو مكملات غذائية:

- الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو قد تناولت مؤخراً أية أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية، بما فيها الأدوية العشبية. وذلك لأن سولفي قد يؤثر على طريقة عمل بعض الأدوية أو قد تؤثر بعض الأدوية على طريقة عمل سولفي.
- من المهم جداً أن تخبر طبيبك لو كنت تتعاطى أي من الأدوية التالية،
 - دواء آخر من مجموعة مضادات الأسيتيل كولين لأن مفعولها وآثارها الجانبية قد تزداد مع سولفي.
 - دواء كوليني، حيث أنه من الممكن أن يقلل من مفعول سولفي.
 - أدوية مثل ميتوكلوبراميد وسيسابراند التي تُسرّع من عمل الجهاز الهضمي حيث أن سولفي من الممكن أن يقلل من مفعولها.
 - أدوية مثل كيتوكونازول، ريتونايفير، تلفنافير، إترانكونازول، فيراباميل ودلتيمازين والتي قد تقلل من سرعة تخلص الجسم من سولفي.
 - أدوية مثل ريفامبيسين، فينتونين وكاربامازيبين والتي قد تزيد من سرعة تخلص الجسم من سولفي.
 - أدوية مثل سيفسفونوات والتي قد تسبب أو تزيد من التهابات البلعوم والريء.

د. تناول سولفي مع الطعام وشراب:

يمكن تناول سولفي مع الطعام أو بدونه حسب ما تفضل.

هـ. الحمل والرضاعة:

- لا يُنصح باستخدام سولفي أثناء الحمل إلا في حالة الضرورة القصوى.
 - يجب عدم استعمال سولفي أثناء الرضاعة الطبيعية حيث يمكن أن يُفرز سوليفيناسين في لبن الثدي.
 - استشر الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ هذا الدواء.
- و. القيادة واستعمال الآلات:
- قد يسبب سولفي زغلة النظر (رؤية غير واضحة) وأحياناً ناعساً أو إرهاقاً. لذلك امتنع عن القيادة واستعمال الآلات لو ظهرت عندك مثل هذه الأعراض الجانبية.

ز. معلومات هامة عن بعض مكونات سولفي

يحتوي سولفي على اللاكتوز. لو أخبرك طبيبك بأنك تعاني من مشاكل وراثية نادرة كعدم تحمل الجالاكتوز، ننصح في لأكترين "لاب" أو اضطراب في امتصاص الجلوكتوز- الجالاكتوز، فلا تستعمل هذا الدواء.

٣. استعمال سولفي،

إرشادات للاستعمال الصحيح

- تناول سولفي تماماً كما وصفه لك طبيبك.
- يجب مراعاة طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.
- يجب بلع قرص سولفي بالكامل مع بعض السوائل. يمكن أخذ القرص مع الطعام أو بدونه حسب ما تفضل. لا تضع القرص.
- الجرعة الاعتيادية هي ٥ ملغم يومياً إلا إذا أعطاك طبيبك تعليمات بتناول ١٠ ملغم يومياً.

إذا تناولت سولفي أكثر مما يجب:

لو تناولت جرعة أكبر من اللازم من سولفي، أو لو تناول طفل منه عن طريق الخطأ، اتصل بطبيبك أو الصيدلي فوراً.

قد تشمل أعراض الجرعة الزائدة على: صداع، جفاف الفم، دوخة، دوار وزغلة بالعين، تخيل أشياء غير موجودة (هلوسة)، هياج زائد، تشنجات، صعوبة في التنفس، زيادة عدد ضربات القلب، احتباس بولي وإسراع دقة العين.

إذا نسيت أخذ سولفي:

لو نسيت أن تتناول قرصاً من سولفي في موعد المعتاد، تناوله بمجرد تذكرك له إلا إذا كان هذا هو موعد تناول الجرعة التالية. لا تأخذ أكثر من جرعة واحدة يومياً. في حالة عدم التأكد، استشر طبيبك أو الصيدلي.

لو توقفت عن تناول سولفي:

لو توقفت عن تناول سولفي، فُسوف تعود لك أعراض المثانة مفرطة النشاط وقد تسوء عن ذي قبل. استشر طبيبك دائماً قبل أن تقرر إيقاف العلاج.

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى حول طريقة استعمال هذا الدواء، اسأل الطبيب أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية المحتملة:

مثل كل الأدوية، قد يسبب سولفي أعراض جانبية، وإن كانت لا تصيب الجميع. إذا تعرضت لنوبة حساسية، أو تفاعل جلدي شديد (مثل التقرحات وتقرش الجلد)، يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي على الفور. في بعض حالات العلاج بسوليفيناسين سكينسات (سولفي) كُوفظ حدوث وذمة وعائية (وهي عبارة عن حساسية بالجلد ينتج عنها تورم في الأنسجة الموجودة تحت سطح الجلد مباشرة) مصاحبة باستسداد في المجاري الهوائية (صعوبة في التنفس).

لو حدث شيء من هذا القبيل، يجب إيقاف سوليفيناسين سكينسات (سولفي) على الفور واتخاذ الإجراء اللازم للعلاج و/أو أي وسائل أخرى.

قد يسبب سولفي ما يلي:

- الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً (تحدث في أكثر من ١٠ من كل ١٠٠ مريض)
- جفاف بالفم.
- الأعراض الجانبية الشائعة (تحدث في أكثر من ١ من كل ١٠٠ مريض وأقل من ١ من كل ١٠ مريض)
- زغلة العين (عدم وضوح الرؤية).
- إمساك، غثيان، غُسر مضم مع أعراض أخرى مثل الارتجاع، ألم بالبطن، تجشؤ، حموضة وعدم ارتياح بالمعدة.
- أعراض جانبية غير شائعة (تحدث في أكثر من ١ من كل ١٠٠ مريض وأقل من ١ من كل ١٠٠ مريض)
- التهابات ميكروبية أو التهابات البولية والمثانة.
- غثاس.
- تغيير في حاسة التذوق.
- جفاف (هيج) بالعين.
- جفاف بالأنف.
- داء الارتجاع (ارتجاع معدي بعلومي).
- جفاف بالحنق.
- جفاف الجلد.
- صعوبة التبول.
- إرهاق.
- تورم الأطراف السفلية (وذمة)

الأعراض الجانبية النادرة (تحدث في أكثر من ١ من كل ١٠٠٠ مريض وفي أقل من ١ من كل ١٠٠٠ مريض)

جميع كمية من البراز الجاف بالقولون (استسداد بالقولون).

تراكم البول بالمثانة وعدم قدرتها على إفراغه (احتباس بولي).

زغلة بالعين وصداع.

قيء.

حكة وطفح جلدي.

الأعراض الجانبية الشاذة جداً (تحدث في أقل من ١ من كل ١٠٠٠ مريض)

هلوسة وإرتباك.

تغيرات في النشاط الكهربائي للقلب (رسم القلب الكهربائي)، ضربات قلب غير منتظمة (تغيرات في الموجات الكهربائية للقلب، الشعور بضربات القلب، تسارع ضربات القلب).

ملتح جلدي نتيجة الحساسية.

- حساسية بالجلد ينتج عنها تورم بالأنسجة تحت الجلد (وذمة وعائية)
- أعراض غير معروفة (لا تسمح البيانات المتوفرة بتحديد معدل حدوثها).

• انخفاض الشهية، وارتفاع نسبة البوتاسيوم بالدم الذي قد يؤدي إلى اختلال نظم القلب.

• ارتفاع ضغط العين.

• تغير في النشاط الكهربائي للقلب (رسم القلب)، وعدم انتظام ضربات القلب (النواء الأطراف)، والشعور بنبضات القلب، وزيادة معدل ضربات القلب.

• اضطراب في الصوت.

• اضطراب في الكبد.

• ضعف العضلات.

• اضطراب في الكلى.

• إذا أصبح أي من الآثار الجانبية خطيراً، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

٥. ظروف تخزين سولفي،

- احفظ الدواء بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.
- لا تحفظ الدواء في درجة حرارة أعلى من ٣٠ °C.
- لا تستعمل سولفي بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على علبة الكرتون بعد كلمة EXP. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.
- لا يتطلب سولفي أي ظروف تخزين خاصة.
- لا ينبغي أن يتم التخلص من الأدوية من خلال مياه الصرف الصحي أو الغابات المزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد لازمة. ومن شأن هذه التدابير أن تساعد على حماية البيئة.

٦. معلومات إضافية:

أ. على ماذا يحتوي سولفي،

- المادة الفعالة هي سوليفيناسين ساكسينات، سولفي ٥: كل قرص مغلف يحتوي على ٥ ملغم سوليفيناسين ساكسينات

سولفي ١٠: كل قرص مغلف يحتوي على ١٠ ملغم سوليفيناسين ساكسينات

- المكونات الأخرى: لأكتروز مونوهيدرات، نشا الذرة، ستيرات المغنسيوم وأوبادي إصفر.

ب. ما هو شكل سولفي الصيدلاني و محتويات العلبة

- الشكل الصيدلاني: أقراص مغلفة.

الوصف الخارجي:

سولفي ٥: أقراص دائرية مغلفة ذات لون أصفر فاتح معدنية الطرفية تحتوي على ٥ ملغم سوليفيناسين ساكسينات.

- سولفي ١٠: أقراص دائرية مغلفة ذات لون ذهري فاتح معدنية الطرفية تحتوي على ١٠ ملغم سوليفيناسين ساكسينات.

- متوفرة في عبوات ٣٠ قرص.

يزود سولفي في شريط ألومنيوم مع غطاء شفاف من مادة PVC/PE/PVDC، معبأة في عبوة كرتونية مع نشرة مطوية.

ج. اسم وعنوان مالك رخصة التسويق و المصنع

شركة التقدم للصناعات الدوائية

المقر- عمان، الأردن

فاكس: ٩٦٢-٦-٤٠٥٠٩١

صندوق بريد: ١٠١٩ عمان ١١٩٤٥ الأردن

البريد الإلكتروني: info@topharm.com

د. تم الموافقة على هذه النشرة بتاريخ: ٢٠١٧/١٧

رقم النسخة: I-Sulfi-SFI-LMO-RO/AE

إن هذا دواء
-الدواء مستحضر يُؤثر على صحتك واسئلهك خلافا لتعليمات
-مريضك المعطر.
-تتبع بدقة وصفة الطبيب بطريقة الاستعمال المتعمد عليها
-تعليمات الصيدلي التي مرصها لك.
-إن الطبيب الصيدلي ما الحيزان بالدواء وينفعه ضرره.
-لا تستخدم دواء العلاج بعدد لك من ققاء نكسك.
-لا تكرر صرف الدواء من وصفة طبية
-لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.
محيط وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيدلة العرب