

ProstanicXR

prolonged release tablets
(film-coated) 0.4 mg
Tamsulosin hydrochloride



Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

1. What **Prostanic XR** is and what it is used for.
2. Before you take **Prostanic XR**.
3. How to take **Prostanic XR**.
4. Possible side effects.
5. How to store **Prostanic XR**.
6. Further information.

1. What **Prostanic XR** is and what it is used for:

Pharmacotherapeutic group:

Prostanic XR is tamsulosin. This is a selective alpha 1A/1D- adrenoceptor antagonist. It reduces tension of the smooth muscles in the prostate and the urethra, enabling urine to pass more readily through the urethra and facilitating urination. In addition, it diminishes sensations of urge.

Therapeutic indications:

Prostanic XR is used in men for the treatment of the complaints of the lower urinary tract associated with an enlarged prostatic gland (benign prostatic hyperplasia). These complaints may include difficulty urinating (poor stream), dribbling, urgency and having to urinate frequently at night as well as during the day.

2. Before you take **Prostanic XR**:

a. Do not take **Prostanic XR**:

- if you are allergic (hypersensitive) to tamsulosin or to any of the other ingredients in **Prostanic XR**. Hypersensitivity may present as sudden local swelling of the soft tissues of the body (e.g. the throat or tongue), difficult breathing and/or itching and rash (angioedema).
- if you suffer from severe liver problems.
- if you suffer from fainting due to reduced blood pressure when changing posture (going to sit or stand up).

b. Take special care with **Prostanic XR**:

- Periodic medical examinations are necessary to monitor the development of the condition you are being treated for.
- Rarely, fainting can occur during the use of **Prostanic XR**, as with other medicinal products of this type. At the first signs of dizziness or weakness you should sit or lie down until they have disappeared.
- If you suffer from severe kidney problems, tell your doctor.
- If you are undergoing or have been scheduled for eye surgery because of cloudiness of the lens (cataract) or increased pressure in the eye (glaucoma). Please inform your eye

specialist that you have previously used, are using or are planning to use **Prostanic XR**. The specialist can then take appropriate precautions with respect to medication and surgical techniques to be used. Ask your doctor whether or not you should postpone or temporarily stop taking this medicine when undergoing eye surgery because of a cloudy lens (cataract) or increased pressure in the eye (glaucoma).

Children

Do not give this medicine to children or adolescent under 18 years because it does not work in this population.

C. Taking other medicines, herbal, or dietary supplements:

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription.

Taking **Prostanic XR** together with other medicines from the same class (alpha1- adrenoceptor blockers) may cause an unwanted decrease in blood pressure.

It is especially important to inform your doctor if you are being treated at the same time with medicines that may decrease the removal of **Prostanic XR** from the body (for example, ketoconazole, erythromycin).

d. Taking with food and drink:

You can take **Prostanic XR** with or without food.

e. Pregnancy, breast - feeding and fertility:

- **Prostanic XR** is not indicated for use in women.
- In men, abnormal ejaculation has been reported (ejaculation disorder). This means that the semen does not leave the body via the urethra, but instead goes into the bladder (retrograde ejaculation) or the ejaculation volume is reduced or absent (ejaculation failure). This phenomenon is harmless.

f. Driving and using machines:

There is no evidence that **Prostanic XR** affects the ability to drive or to operate machinery or equipment. However, you should bear in mind that dizziness can occur, in which case you should not undertake in these activities that require attentiveness.

3. How to take **Prostanic XR**:

Always take **Prostanic XR** exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure. You can take **Prostanic XR** with or without food, preferably at the same time of each day.

The tablet must be swallowed whole and not be crushed or chewed.

Prostanic XR is a specially designed tablet from which the active ingredient is gradually released, once the tablet has been ingested. It is possible that you observe a remnant of the tablet in your stool. Since the active ingredient has been released already, there is no risk of the tablet being less effective.

Usually, **Prostanic XR** is prescribed for long periods of time. The effects on the bladder and on urination are maintained during long-term

treatment with **Prostanic XR**.

If you take more **Prostanic XR** than you should:

Taking too many **Prostanic XR** tablets may lead to an unwanted decrease in blood pressure and an increase in heart rate, with feelings of faintness. Contact your doctor immediately if you have taken too much **Prostanic XR**.

If you forget to take **Prostanic XR**:

You may take your daily **Prostanic XR** tablet later the same day if you have forgotten to take it as recommended. If you have missed a day, just continue to take your daily tablet as prescribed. Never take a double dose to make up for the forgotten tablet.

If you stop taking **Prostanic XR**:

When treatment with **Prostanic XR** is stopped prematurely, your original complaints may return. Therefore use **Prostanic XR** as long as your doctor prescribes, even if your complaints have disappeared already. Always consult your doctor, if you consider stopping this therapy.

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.

4. Possible side effects

Like all medicines, **Prostanic XR** can cause side effects, although not everybody gets them.

- Common (less than 1 in 10, more than 1 in 100 (1-10%)):
 - Dizziness, particularly when going to sit or stand up.
 - Abnormal ejaculation (ejaculation disorder). This means that semen does not leave the body via the urethra, but instead goes into the bladder (retrograde ejaculation) or the ejaculation volume is reduced or absent (ejaculation failure). This phenomenon is harmless.
- Uncommon (more than 1 in 1000, less than 1 in 100 (0,1-1%)):
 - Headache, palpitations (the heart beats more rapidly than normal and it is also noticeable), reduced blood pressure e.g. when getting up quickly from a seating or lying position sometimes associated with dizziness; runny or blocked nose (rhinitis), diarrhoea, feeling sick and vomiting, constipation, weakness (asthenia), rashes, itching and hives (urticaria).
- Rare (more than 1 in 10,000, less than 1 in 1000 (0,01-0,1%)):
 - Faintness and sudden local swelling of the soft tissues of the body (e.g. the throat or tongue) difficult breathing and / or itching and rash, often as an allergic reaction (angioedema).
- Very rare (less than 1 in 10,000 (<0,01%)):
 - Priapism (painful prolonged unwanted erection for which immediate medical treatment is required).
 - Rash, inflammation and blistering of the skin and/or mucous membranes of the lips, eyes, mouth, nasal passages or genitals (Stevens-Johnson syndrome).
- Not known (frequency cannot be estimated from the available data):
 - blurred vision.
 - impaired vision.
 - nose bleeds (epistaxis).
 - serious skin rashes (erythema multiform, dermatitis exfoliative).
 - Abnormal irregular heart rhythm (atrial fibrillation, arrhythmia, tachycardia), difficult breathing (dyspnoea).
- If you are undergoing eye surgery because of cloudiness of the lens

(cataract) or increased pressure in the eye (glaucoma) and are already taking or have previously taken **Prostanic XR**, the pupil may dilate poorly and the iris (the coloured circular part of the eye) may become floppy during the procedure.

- dry mouth.

If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

Reporting of suspected adverse reactions

Website: jpc@jfda.jo

The link to the electronic reporting on JFDA website (www.jfda.com):

<https://primaryreporting.who-umc.org/JO>

Tel: +962-6-5632000

rapid response number QR Code:



5. How to store **Prostanic XR**

- Keep out of the reach and sight of children.

- Do not use **Prostanic XR** after the expiry date, which is stated on the carton and the blister after Exp., The expiry date refers to the last day of that month.

- Do not store above 30°C.

- Medicines which should be disposed of via wastewater or household waste.

Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

6. Further information

a. What **Prostanic XR** contains:

The active substance is: Tamsulosin hydrochloride.

b. what **Prostanic XR** look like and contents of the pack:

Prostanic XR 0.4mg: Each Prolonged Release Tablet contains 0.4 mg Tamsulosin HCl in packs of 30 tablets. Hospital packs are also available (500, 1000).

Not all pack sizes are available in all countries.

The other ingredient: Polyethylene Oxide, Butylated Hydroxy toluene (BHT), Hydroxypropyl cellulose, Anhydrous Colloidal silica, Magnesium Stearate, OPADRY II white, Yellow Iron Oxide.

- **Physical Description:**
Dark Yellow round, biconvex film coated tablets debossed with AS1 on one side and plain on the other side.

- **Pharmaceutical form:**
prolonged release tablets (film-coated).

c. Marketing Authorization Holder Al-Taqaddom Pharmaceutical Industries

Almwaqqar – Amman, Jordan

Tel.: +962-6-4050092

Fax: +962-6-4050091

P.O. Box: 1019 Amman 11947 Jordan

Email: info@tqpharma.com

d. This leaflet was last revised in 05/2022;

I-ProstanicXR-PXR-UM0-R0-AE

This is a medicament

- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep medicament out of the reach of children.

COUNCIL OF ARAB HEALTH MINISTERS
UNION OF ARAB PHARMACISTS

بروستاتك إكس آر

أقراص مغلفة طويلة المفعول

٠,٤ ملغم

تامسولوسين هيدروكلوريد

قم بقراءة هذه النشرة جيداً قبل

استعمال أو تناول هذا الدواء

– احفظ بهذه النشرة، لأنك قد تحتاج إليها لاحقاً.

– في حال كانت لديك أية أسئلة تتعلق بهذا المستحضر قم باستشارة الطبيب أو الصيدلي.

– إن هذا الدواء قد تم صرفه خصيصاً لك بناءً على وصفة طبية، و لهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص، قد يضر به، وحتى إن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وأن عانيت منها.

– قم بالاتصال بطبيبك المعالج أو الصيدلي في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الإصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

تحتوي هذه النشرة على:

١. ما هو بروستاتك إكس آر وما هي دواعي استعماله.
٢. قبل القيام بتناول أو استعمال بروستاتك إكس آر.
٣. طريقة استعمال بروستاتك إكس آر.
٤. الأعراض الجانبية المحتملة.
٥. ظروف تخزين بروستاتك إكس آر.
٦. معلومات إضافية.

١. ما هو بروستاتك إكس آر وما هي دواعي استعماله، المجموعة العلاجية:

بروستاتك إكس آر هي تامسولوسين. وهذه المادة عبارة عن مُضاد نوعي لمستقبل الحث حيث تقلل هذه المادة من توتر العضلات المساء في البروستات والإحليل (مجري البول). وتمكن البول من المرور بسهولة أكبر عبر الإحليل وتيسير عملية التبول. بالإضافة إلى ذلك، تقلل من الإحساس بالحاجة الملحة للتبول.

الاستخدامات:

يستخدم دواء بروستاتك إكس آر في العلاج لمعالجة أعراض الجهاز البولي السفلي المرتبطة بضعف غدة البروستات (فرط تنسج البروستات الحميد). وقد تشمل هذه الأعراض صعوبة التبول (عسر تدفق البول)، تقاطر وإلحاح البول والحاجة إلى التبول المتكرر ليلاً ونهاراً.

٢. قبل القيام بتناول أو استعمال بروستاتك إكس آر:

أ. لا تأخذ بروستاتك إكس آر:

– إذا كنت تعاني من حساسية (فرط الحساسية) مادة تامسولوسين أو أي من المكونات الأخرى في بروستاتك إكس آر. وقد يحدث فرط الحساسية في صورة تورم موضعي مفاجيء للأنسجة المخاطية للجسم (مثل الحلق أو اللسان) وصعوبة التنفس و/أو الحكة والطفح الجلدي (أنجيويديما).

– إذا كنت تعاني من مشاكل شديدة في الكبد.

– إذا كنت تعاني من الإغماء بسبب انخفاض ضغط الدم عند تغيير الوضعية (الجلوس أو الوقوف).

ب. الاحتياطات عند استعمال بروستاتك إكس آر:

– الفحوصات الطبية الدورية ضرورية لمراقبة تطور الحالة التي تتعالج منها. – نادراً، يمكن أن يحدث إغماء أثناء استعمال بروستاتك إكس آر. كما هو الحال عند المستحضرات الطبية من هذا النوع. عند حدوث أول أعراض الدوار أو الوهن المفاجيء يجب أن تجلس أو تستلقي حتى تختفي تلك الأعراض.

– إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى، فقم بإخبار الطبيب المعالج.

– إذا كنت تضعه أو تنوي الخضوع لجراحة في العين بسبب عتامة عدسة العين (كاتاركت أو المياه البيضاء) أو ارتفاع

TA PHARMA
Total Quality
شركة التقدم للصناعات الدوائية
Al-Tagaddom Pharmaceutical Industries

الضغط في العين (الزرق). يرجى إخبار طبيب العين أنك قد استعملت أو ستعمل أو ستخطط لاستعمال بروستاتك إكس آر. إذ يستطيع المخص عندئذ أن يتخذ الاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بالدواء وتقنيات الجراحة التي سيتم استخدامها. أسأل الطبيب المعالج ما إذا كان يجب عليك تأجيل تناول الدواء أو إيقافه مؤقتاً أم لا عند خضوعك لجراحة بالعين بسبب عتامة العدسة (كاتاركت) أو ارتفاع الضغط في العين (الزرق).

الأطفال

لا تعطي هذا الدواء للأطفال أو المراهقين تحت سن ١٨ سنة لأنه لا يُوصف لهذه الفئة العمرية.

ج. التداخلات الدوائية عند أخذ هذا

الاستحضر مع أية أدوية أخرى أو

أغذية أو مكملات غذائية:

يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو قد تناولت مؤخراً أية أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية.

تناول بروستاتك إكس آر مع أدوية أخرى

من نفس المجموعة الدوائية (مُضادات المستقبل الأدريناليني ألفا ١) قد يسبب انخفاضاً غير مرغوب فيه في ضغط الدم.

من المهم أن تخبر الطبيب المعالج إذا كنت

تُعالج في نفس الوقت بأدوية قد تقلل إزالة

بروستاتك إكس آر من الجسم (مثل

كينوكسازول وإريثرومايسين).

د. تناول بروستاتك إكس آر مع الطعام

والشراب:

يمكن تناول بروستاتك إكس آر مع الطعام أو بدون.

هـ. الحمل، الرضاعة والخصوبة:

يُمنع وصف واستعمال بروستاتك إكس

آر للحمليدات.

– لقد تم الإبلاغ عن وجود حالات قدف غير

طبيعية عند الرجال (اضطرابات القدف).

وهذا يعني أن الحيوانات المنوية لا تخرج من

الجسم عبر الإحليل بل تذهب إلى المثانة بدلاً

من ذلك (القدف الارتجاعي). أو ينخفض

حجم القدف أو يغيب كلياً. وهذه الظاهرة

غير مؤقتة.

و. القيادة واستعمال الآلات:

يمكن هناك دليل على أن بروستاتك إكس

آر يؤثر على القدرة على القيادة أو تشغيل

المكينات أو الأجهزة. ومع ذلك، يجب الانتباه

أنه من الممكن التعرض للدوار. وفي هذه

الحالة يجب عدم القيام بهذه النشاطات التي

تتطلب الانتباه.

٣. طريقة استعمال بروستاتك إكس

آر:

تناول بروستاتك إكس آر دائماً بالطريقة

التي أخبرك بها طبيبك. تحقق مع طبيبك أو

الصيدلي إذا لم تكن متأكد.

يمكن أن تتناول بروستاتك إكس آر مع

الطعام أو بدون، ويُفضل تناوله في نفس

الوقت من كل يوم.

يجب بلع القرص كاملاً بدون تكسير أو مضغ.

لقد تم تصنيع أقراص بروستاتك إكس آر

بشكل خاص بحيث يسمح بإطلاق المادة

الفعالة منه تدريجياً بعد بلع القرص. من

المحتمل أن تلاحظ بقايا القرص في البراز.

سكنون المادة الفعالة قد انطلقت بالفعل، ولا

يعني ذلك أن القرص أقل فعالية.

عادة يوصف بروستاتك إكس آر لمدة طويلة

من الزمن. يستمر مفعول بروستاتك إكس

آر على المثانة وعلى التبول أثناء فترة العلاج.

إذا تناولت بروستاتك إكس آر أكثر

مما يجب:

تناول عدد أكبر مما يجب من أقراص

بروستاتك إكس آر قد يؤدي إلى انخفاض

غير مرغوب في ضغط الدم وزيادة في معدل

ضربات القلب مع الإحساس بالإغماء. اتصل

بالطبيب المعالج فوراً إذا تناولت أكثر مما

يجب من بروستاتك إكس آر.

إذا نسيت تناول بروستاتك إكس آر:

يمكنك تناول القرص اليومي من

بروستاتك إكس آر لاحقاً في نفس اليوم إذا

نسيت تناوله كما هو موصوف. إذا مر يوم

كامل دون أن تتناول الجرعة، فاستمر في

تناول القرص اليومي كما هو موصوف لك.

ولا تتناول أبداً جرعة مضاعفة لتعويض

الجرعة النسيبة.

إذا توقفت عن تناول بروستاتك إكس

آر:

عند إيقاف العلاج باستعمال بروستاتك

إكس آر، قد تعاود نفس الأعراض التي

كنت تعاني منها. ولذلك، استمر في تناول

بروستاتك إكس آر طالما وصف الطبيب

المعالج ذلك، حتى وإن اختفت الأعراض

بالفعل.

احرص على استشارة الطبيب المعالج إذا

هكرت في إيقاف العلاج.

كما ينبغي إخبار الطبيب أو الصيدلي في

حالة وجود أية أسئلة إضافية متعلقة

باستعمال هذا الدواء.

٤. الأعراض الجانبية المحتملة:

يكفي الأدوية الأخرى، قد يسبب

بروستاتك إكس آر أعراض جانبية، على

الرغم بأنها لا تصيب الجميع.

• أعراض جانبية شائعة (أقل من ١ بين كل

١٠، وأكثر من ١ بين كل ١٠٠ (١٠٠-١٪) و

تشمل على:

– دوار، خاصة عند الجلوس أو الوقوف.

– قدف غير طبيعي (اضطرابات في

القدف). وهذا يعني أن الحيوانات المنوية لا

تخرج من الجسم عبر الإحليل بل تذهب إلى

المثانة بدلاً من ذلك (القدف الارتجاعي). و

ينخفض حجم القدف أو يغيب كلياً. وهذه

الظاهرة غير مؤقتة.

• أعراض جانبية غير شائعة (أكثر من ١ بين

كل ١٠٠٠، وأقل من ١ بين كل

١٠٠٠ (١٠٠-١٪) وتشمل على:

– الصداع، الخفقان (ضربات القلب أسرع

من الطبيعي بشكل ملحوظ). انخفاض

ضغط الدم لدى النهوض سريعاً من وضع

الجلوس أو في وضع القرفصاء وأحياناً يرتبط

ذلك بالدوار والشرع أو انسداد الأنف

(التهاب الأنف)، الإسهال، الشعور بالإعياء

والقيء، الإسهال، الصداع (الوهن)، طفح

جلدي، حكة وشرى (أرتيكاريا).

• أعراض جانبية نادرة (أكثر من ١ بين كل

١٠٠٠٠، وأقل من ١ بين كل ١٠٠٠ (١٠٠-٠,٠١٪)

تشمل على:

– إغماء، تورم موضعي مفاجيء للأنسجة

الرخوة في الجسم (مثل الحلق أو اللسان)،

صعوبة في التنفس و/أو الحكة والطفح

الجلدي، غالباً كشكل حساسية

(أنجيويديما).

• أعراض جانبية نادرة جداً (أقل من ١ في

١٠٠٠٠ (٠,٠١٪) وتشمل على:

– سُحاح (انتصاب مؤلم وطويل الأمد وغير

مرغوب فيه والذي يستمر عالجاً طبيًا

فورياً).

– طفح جلدي، التهاب وظهور تقرحات

بالجلد و/أو الأغشية المخاطية للشفة،

العينين، الفم، مجاري الأنف أو الأعضاء

التناسلية (متلازمة ستيفنز-جونز).

• أعراض جانبية غير معروفة (لا يمكن

تقدير نسبة حدوثها من التقارير المتاحة):

– تشوش الإبصار.

– ضعف الرؤية.

– ثَريب (الأنف) (الرعاف).

– طفح جلدي خطير (حمامي متعدد

الأسطح). التهاب الجلد التقرشي).

– اضطراب ضربات القلب الغير طبيعية و

الغير منتظمة (ارتجاف أذيني، اضطراب

النظم وتضارب ضربات القلب)، صعوبة

التنفس (انتفاخ النفس).

– إذا كنت تخضع لجراحة بالعين بسبب

عتامة في عدسة العين (كاتاركت أو المياه

البيضاء) أو ارتفاع الضغط في العين

(الزرق) وكنت تتناول بالفعل أو كنت قد

تناولت سابقاً بروستاتك إكس آر، فإن

حقيقة العين قد تتسع بصعوبة وكذلك

القزحية (الجزء المستدير الملون في العين)

قد تصيب لينة أثناء إجراء الجراحة.

– جفاف الحلق.

إذا أصبح أي من الآثار الجانبية خطيراً، أو

إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مذكورة في

هذه النشرة، يرجى إخبار الطبيب أو

الصيدلي.

للإبلاغ عن الآثار الجانبية

البريد الإلكتروني، jpc@jfda.jo

رابط الإبلاغ الإلكتروني على موقع

المؤسسة (www.jfda.com)

https://primaryreporting.who-umc.org/JO

الهاتف: +٩٦٢-٥٦٣٢٠٠٠

رقم الاستجابة السريعة QR

Code:



٥. ظروف تخزين بروستاتك إكس آر:

– احفظ الدواء بعيداً عن متناول و نظر

الأطفال.

– لا تستعمل بروستاتك إكس آر بعد

انقضاء تاريخ الصلاحية المدون على علبة

الكرتون وعلى الشريط بعد كلمة: Exp.

يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من

الشهر المذكور.

– لا يحفظ الدواء في درجة حرارة أعلى من

٣٠°م.

– يجب عدم التخلص من الأدوية خلال مياه

الصرف الصحي أو التفايات المنزلية، اسأل

الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية

التي لا تعد لازمة. ومن شأن هذه التدابير أن

تساعد على حماية البيئة.

٦. معلومات إضافية:

أ. على ماذا يحتوي بروستاتك إكس

آر:

– المادة الفعالة: تامسولوسين هيدروكلوريد.

ب. ما هو شكل و محتوى عبوة

بروستاتك إكس آر:

بروستاتك إكس آر ٠,٤ ملغم، يحتوي كل

قرص طويل المفعول على ٠,٤ ملغم

تامسولوسين هيدروكلوريد في عبوة سعة ٣٠

قرص.

غروت المستشفيات متوفرة أيضاً (٥٠٠ و

١٠٠٠).

ليست جميع أحجام العبوات متوفرة في جميع

الأسواق.

المكونات الأخرى: أكسيد البولي إثيلين،

هيدروكسي التولوين بوتيل (BHT)،

هيدروكسي بروبيل سيوليك، الإيثانول،

سيليكات غروية لامائية، ستيرات الغنيسوم،

أوبادراي أبيض، أكسيد الحديد الأصفر.

– الوصف الخارجي:

أقراص مستديرة صفراء داكنة، مححدة من

الجانبين محطبة بغطاء مطغوم عليها ASI

من جانب وفارغة من الجانب الآخر.

– الشكل الصيدلاني:

أقراص مغلفة طويلة المفعول.

ج. اسم و عنوان مالك رخصة التسويق

المقر: عمان، الأردن

هاتف: +٩٦٢ - ٤٥٠٠٩٢ - ٦

فاكس: +٩٦٢ - ٤٥٠٠٩١ - ٦

صندوق بريدي: ١٠١٩ عمان ١١٩٤٧ الأردن

البريد الإلكتروني:

info@tpharma.com

د. تم مراجعة هذه النشرة بتاريخ

٢٠٢٢/٥

I-ProstancXR-PXR-LMO-RO-AE

إن هذا دواء
– الدواء: مستحضر يُؤثر على ضغط الدم واستهلاكه خلافاً لتعليمات
برمجة المصنع.
– يرجى قراءة رسالة الطبيب وعطرية استعمال المصنوع عليها
وتعليمات الصيدلي التي تأتي مع هذا الدواء.
– إن الطبيب الصيدلي الذي لا يخبرنا أن الدواء قد تم استخدامه، ونفقه وصره
لا يتحمل مسؤولية العلاج المحددة لك من قِبلنا، ننصحك.
– لا تترك صرف الدواء بدون وصفة منك.
– لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.
محلى وزارة الصحة العرب
لتحسين الصيدلة العرب